Ficha para praticar 7

Págs. 34 a 37

1.1. Seja $y = mx + b$ a equação pedida.O declive, m , é igual à tangente trigonométrica da inclinação.

Assim,

$$m = \tan\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \tan\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{Portanto, } y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + b.$$

Como o ponto $A(2\sqrt{3}, 1)$ pertence à reta:

$$1 = -\frac{\sqrt{3}}{3} \times 2\sqrt{3} + b \Leftrightarrow 1 = -2 + b \Leftrightarrow b = 3$$

$$\text{Então, a equação pedida é } y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + 3.$$

1.2. O declive, m , da reta AB é:

$$m = \frac{2-1}{3\sqrt{3}-2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Seja α a inclinação da reta AB , então,

$$\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3} \wedge \alpha \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[, \text{ portanto, } \alpha = \frac{\pi}{6}.$$

Portanto, a inclinação da reta AB é $\frac{\pi}{6}$ radianos.1.3. A reta AB tem declive igual a $\frac{\sqrt{3}}{3}$, pelo que $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + b$ éa equação reduzida da reta AB .Determinemos a ordenada na origem b .O ponto $A(2\sqrt{3}, 1)$ pertence à reta AB , portanto,

$$1 = \frac{\sqrt{3}}{3} \times 2\sqrt{3} + b \Leftrightarrow 1 = 2 + b \Leftrightarrow b = -1.$$

Assim, $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - 1$ é a equação reduzida da reta AB .Determinemos, agora, as coordenadas do ponto de interseção da reta AB com eixo Ox .

$$\begin{cases} y = 0 \\ y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ 0 = \frac{\sqrt{3}}{3}x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{3}x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = \frac{3}{\sqrt{3}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = \sqrt{3} \end{cases}$$

As coordenadas do ponto de interseção são $(\sqrt{3}, 0)$.2.1. a) Seja $y = mx + b$ a equação pedida.O declive, m , é igual à tangente trigonométrica da inclinação.

Assim:

$$m = \tan(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ temos, assim, } y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + b.$$

Como o ponto $A(-2, 3)$ pertence à reta:

$$3 = \frac{\sqrt{3}}{3}(-2) + b \Leftrightarrow 3 = -\frac{2\sqrt{3}}{3} + b \Leftrightarrow b = 3 + \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{A equação pedida é } y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 3 + \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

b) Seja $y = mx + b$ a equação pedida.O declive, m , é igual à tangente trigonométrica da inclinação.

Assim:

$$m = \tan\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \tan\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\tan\frac{\pi}{4} = -1 \text{ e } y = -x + b$$

Como o ponto $A(-2, 3)$ pertence à reta:

$$3 = -1 \times (-2) + b \Leftrightarrow 3 = 2 + b \Leftrightarrow b = 1$$

A equação pedida é $y = -x + 1$.c) Seja $y = mx + b$ a equação pedida.O declive, m , é igual à razão trigonométrica de inclinação.

Assim:

$$m = \tan\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \tan\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$$

Assim, $y = -\sqrt{3}x + b$.Como o ponto $A(-2, 3)$ pertence à reta:

$$3 = -\sqrt{3} \times (-2) + b \Leftrightarrow 3 = 2\sqrt{3} + b \Leftrightarrow b = 3 - 2\sqrt{3}$$

Portanto, $y = -\sqrt{3}x + 3 - 2\sqrt{3}$ é a equação pedida.2.2. a) O declive, m , da reta AB é:

$$m = \frac{3-1}{-2-0} = -1$$

Seja α a inclinação da reta AB , então:

$$\tan \alpha = -1 \wedge \alpha \in \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[, \text{ ou seja, } \alpha = \frac{3\pi}{4} \text{ rad.}$$

A inclinação da reta AB é $\frac{3\pi}{4}$ rad.b) O declive da reta AC é $m = \frac{3+4}{-2+3} = 7$.Seja α a inclinação da reta AC , então:

$$\tan \alpha = 7 \wedge \alpha \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[, \text{ portanto, } \alpha = \arctan 7 \approx 1,4 \text{ rad.}$$

A reta AC tem inclinação, aproximadamente, igual a 1,4 rad.c) O declive da reta BC é $m = \frac{1+4}{0+3} = \frac{5}{3}$.Seja α a inclinação da reta BC , então:

$$\tan \alpha = \frac{5}{3} \wedge \alpha \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$$

$$\text{Portanto, } \alpha = \arctan\left(\frac{5}{3}\right) \approx 1,0 \text{ rad.}$$

A reta BC tem inclinação, aproximadamente, igual a 1,0 rad.3.1. $\overline{BC} = 1$ e $\overline{AB} = 2\overline{BC}$, pelo que $\overline{AB} = 2$.

Assim:

$$A\left(-1, -\frac{1}{2}\right), B\left(1, -\frac{1}{2}\right), C\left(1, \frac{1}{2}\right) \text{ e } D\left(-1, \frac{1}{2}\right)$$

3.2. a) O declive, m , da reta OC é igual a $\tan \alpha$ e $m = \frac{1}{2}$.

$$\tan \alpha = \frac{1}{2} \wedge \alpha \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[.$$

$$\text{Logo, } \alpha = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) \approx 26,6^\circ.$$

2.1. Declive e inclinação de uma reta. Produto escalar

b) O declive, m , da reta OD é igual a $\tan \beta$ e $m = -\frac{1}{2}$.

$$\tan \beta = -\frac{1}{2} \wedge \beta \in \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[, \text{ pelo que}$$

$$\beta = 180^\circ - \arctan\left(\frac{1}{2}\right), \text{ ou seja, } \beta \approx 153,4^\circ.$$

Portanto, a inclinação da reta OD é, aproximadamente, igual a $153,4^\circ$.

3.3. Tem-se que:

$$\begin{aligned} A\hat{O}B = C\hat{O}D = \beta - \alpha &= \left[\pi - \arctan\left(\frac{1}{2}\right) \right] - \arctan\left(\frac{1}{2}\right) \approx \\ &\approx 2,21 \text{ rad} \end{aligned}$$

4. A reta tem inclinação igual a 120° .

O declive, m , da reta é igual à tangente trigonométrica da inclinação.

$$\text{Portanto, } m = \tan(120^\circ) = \tan(180^\circ - 60^\circ) = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}.$$

Como a reta passa pela origem, o ponto de coordenadas $(0, 0)$ pertence à reta.

Por outro lado, como o declive é $-\sqrt{3}$, um vetor diretor da reta tem coordenadas, por exemplo, $(1, -\sqrt{3})$.

Assim, uma equação vetorial da reta é:

$$(x, y) = k(1, -\sqrt{3}), k \in \mathbb{R}$$

5. $2x + 5y - 3 = 0 \Leftrightarrow 5y = -2x + 3 \Leftrightarrow y = -\frac{2}{5}x + \frac{3}{5}$, pelo que o

declive da reta r é igual a $-\frac{2}{5}$.

Seja α a inclinação da reta r , então

$$\tan \alpha = -\frac{2}{5} \wedge \alpha \in \left] -\frac{\pi}{2}, \pi \right[$$

Portanto, $\alpha = \pi - \arctan\left(\frac{2}{5}\right) \approx 2,8$ rad.

Assim, um valor aproximado à décima do radiano da inclinação da reta r é $2,8$ rad.

$$6.1. \left(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB} \right) = 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$$6.2. \left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB} \right) = 120^\circ = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$$

$$6.3. \left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CM} \right) = 150^\circ = \frac{5\pi}{6} \text{ rad}$$

$$6.4. \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB} \right) = 0^\circ = 0 \text{ rad}$$

$$6.5. \left(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BM} \right) = 180^\circ = \pi \text{ rad}$$

$$6.6. \left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{MC} \right) = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

$$7.1. \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{ED} = \|\overrightarrow{EF}\| \cdot \|\overrightarrow{ED}\| \times \cos\left(\widehat{EF, ED}\right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{ED} = 4 \times 4 \times \cos(120^\circ) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{ED} = 16 \times \cos(180^\circ - 60^\circ) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{ED} = 16 \times (-\cos 60^\circ) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{ED} = 16 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{ED} = -8$$

$$7.2. \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD} = \|\overrightarrow{BC}\| \|\overrightarrow{CD}\| \times \cos\left(\widehat{BC, CD}\right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD} = 4 \times 4 \times \cos(60^\circ) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD} = 16 \times \frac{1}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD} = 8$$

7.3. $\overrightarrow{ED}$ e $\overrightarrow{FC}$ têm o mesmo sentido, pelo que

$$\overrightarrow{ED} \cdot \overrightarrow{FC} = \|\overrightarrow{ED}\| \times \|\overrightarrow{FC}\| \Leftrightarrow \overrightarrow{ED} \cdot \overrightarrow{FC} = 4 \times 8 \Leftrightarrow \overrightarrow{ED} \cdot \overrightarrow{FC} = 32$$

7.4. $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BD}$, portanto $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$.

7.5. O triângulo $[BDF]$ é equilátero, pelo que $\left(\overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FD}\right) = 60^\circ$.

$$\text{Então, } \overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FD} = \|\overrightarrow{FB}\| \|\overrightarrow{FD}\| \times \cos(60^\circ).$$

Por outro lado:

$$\sin 60^\circ = \frac{\overline{FM}}{4} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\overline{FM}}{4} \Leftrightarrow \overline{FM} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{Logo, } \|\overrightarrow{FB}\| = 2\overline{FM} = 4\sqrt{3}.$$

Assim:

$$\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FD} = 4\sqrt{3} \times 4\sqrt{3} \times \frac{1}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FD} = 24$$

7.6. $\overrightarrow{AD}$ e $\overrightarrow{CB}$ têm sentidos contrários, pelo que

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CB} = -\|\overrightarrow{AD}\| \times \|\overrightarrow{CB}\| = -8 \times 4 = -32$$

8. A área do trapézio $[BCDE]$ é igual a 10, pelo que,

$$\frac{\overline{EB} + \overline{DC}}{2} \times \overline{BC} = 10 \Leftrightarrow \frac{\overline{EB} + 4}{2} \times 4 = 10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\overline{EB} + 4) \times 2 = 10 \Leftrightarrow \overline{EB} + 4 = 5 \Leftrightarrow \overline{EB} = 1$$

Por outro lado, tem-se que $\overline{FC} = 3$ e $\overline{BC} = 4$, pelo que $\overline{BF} = 1$.

8.1. $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{BE}$ têm sentidos contrários, pelo que

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BE} = -\|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{BE}\| = -4 \times 1 = -4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BE} = -4$$

8.2. $\overrightarrow{EB}$ e $\overrightarrow{AD}$ são perpendiculares, portanto $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$.

$$8.3. \overrightarrow{ED} \cdot \overrightarrow{DC} = \|\overrightarrow{ED}\| \|\overrightarrow{DC}\| \times \cos\left(\widehat{ED, DC}\right)$$

$$\cos\left(\widehat{ED, DC}\right) = -\cos\left(\widehat{DE, DC}\right) = -\cos(\widehat{EDC}) = -\frac{\overline{AE}}{\overline{ED}}$$

Por outro lado:

$$\overline{AE}^2 + \overline{AD}^2 = \overline{ED}^2 \Leftrightarrow 3^2 + 4^2 = \overline{ED}^2, \text{ logo } \overline{ED} = 5.$$

$$-\cos(\widehat{EDC}) = -\frac{3}{5}, \text{ ou seja, } \cos\left(\widehat{ED, DC}\right) = -\frac{3}{5}$$

Então:

$$\overrightarrow{ED} \cdot \overrightarrow{DC} = \|\overrightarrow{ED}\| \|\overrightarrow{DC}\| \times \cos\left(\widehat{ED, DC}\right) = 5 \times 4 \times \left(-\frac{3}{5}\right) = -12$$

$$8.4. \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CB} = \|\overrightarrow{DE}\| \|\overrightarrow{CB}\| \times \cos\left(\widehat{DE, CB}\right)$$

Tem-se que

$$\cos\left(\widehat{DE, CB}\right) = \cos\left(\widehat{DE, DA}\right) = \cos(\widehat{ADE}) = \frac{\overline{AD}}{\overline{DE}} = \frac{4}{5}.$$

$$\text{Portanto, } \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CB} = 5 \times 4 \times \frac{4}{5} = 16.$$

$$\text{De outra forma: } \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DA} = 4 \times 4 = 16$$

2.1. Declive e inclinação de uma reta. Produto escalar

$$9. \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\widehat{u, v}) = 3 \times 5 \times \cos(120^\circ) = \\ = 15 \times \cos(180^\circ - 60^\circ) = -15 \times \cos 60^\circ = -15 \times \frac{1}{2} = -\frac{15}{2}$$

$$9.1. \quad (2\vec{u})\vec{v} = 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) = 2 \times \left(-\frac{15}{2}\right) = -15$$

$$9.2. \quad (-4\vec{v})(3\vec{u}) = (-4 \times 3)(\vec{v} \cdot \vec{u}) = -12(\vec{u} \cdot \vec{v}) = -12 \times \left(-\frac{15}{2}\right) = 90$$

$$9.3. \quad (\vec{v} + 4\vec{u}) \cdot \vec{u} = \vec{v} \cdot \vec{u} + 4\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{v} \cdot \vec{u} + 4\|\vec{u}\|^2 = \\ = -\frac{15}{2} + 4 \times 3^2 = -\frac{15}{2} + 36 = \frac{57}{2}$$

$$9.4. \quad (6\vec{u} - 2\vec{v})(3\vec{v}) = 18\vec{u} \cdot \vec{v} - 6\vec{v} \cdot \vec{v} = 18\vec{u} \cdot \vec{v} - 6\|\vec{v}\|^2 = \\ = 18 \times \left(-\frac{15}{2}\right) - 6 \times 5^2 = -135 - 150 = -285$$

10. Seja m o declive da reta r .

$$m = \frac{1}{3}, \text{ portanto } \tan \theta = \frac{1}{3} \wedge \theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[, \text{ ou seja,}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{1}{3}\right).$$

Por outro lado, $\vec{t}(1, -4)$ é um vetor diretor da reta t , pelo

que o declive m' desta reta é $m' = -\frac{4}{1} = -4$. Logo,

$$\tan \alpha = -4 \wedge \alpha \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[, \text{ ou seja, } \alpha = \pi - \arctan(4).$$

Assim:

$$\beta = \alpha - \theta \Leftrightarrow \beta = \pi - \arctan(4) - \arctan\left(\frac{1}{3}\right) \Leftrightarrow \beta \approx 1,5 \text{ rad}$$

$$11.1. \quad \overline{DC} \cdot \overline{EF} = \|\overline{DC}\| \|\overline{EF}\| \cos(\widehat{DC, EF}) = \\ = \sqrt{2} \times \sqrt{2} \cos 0^\circ = \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times 1 = 2$$

$$11.2. \quad \overline{AC} \cdot \overline{DB} = \|\overline{AC}\| \|\overline{DB}\| \cos(\widehat{AC, DB}) = \\ = \|\overline{AC}\| \|\overline{DB}\| \cos 90^\circ = \|\overline{AC}\| \|\overline{DB}\| \times 0 = 0$$

$$11.3. \quad \overline{BG} \cdot \overline{BD} = \|\overline{BG}\| \|\overline{BD}\| \cos(\widehat{BG, BD}) = \\ = 2 \times 2 \times \cos 60^\circ = 2 \times 2 \times \frac{1}{2} = 2$$

$$11.4. \quad \overline{AE} \cdot \overline{AG} = \|\overline{AE}\| \|\overline{AG}\| \cos(\widehat{AE, AG}) = \\ = \sqrt{2} \times \sqrt{6} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \\ = 2$$

$$11.5. \quad \overline{AG} \cdot \overline{AH} = (\overline{AH} + \overline{HG}) \cdot \overline{AH} = \\ = \overline{AH} \cdot \overline{AH} + \overline{HG} \cdot \overline{AH} = \|\overline{AH}\|^2 + 0 = 2^2 = 4$$

$$11.6. \quad \overline{AG} \cdot \overline{BH} = (\overline{AB} + \overline{BG}) \cdot (\overline{BG} + \overline{GH}) = \\ = \overline{AB} \cdot \overline{BG} + \overline{AB} \cdot \overline{GH} + \overline{BG} \cdot \overline{BG} + \overline{BG} \cdot \overline{GH} = \\ = 0 - \overline{AB} \cdot \overline{AB} + \|\overline{BG}\|^2 + 0 = -\|\overline{AB}\|^2 + 2^2 = \\ = -(\sqrt{2})^2 + 4 = -2 + 4 = 2$$

$$12. \quad \text{Seja } m \text{ o declive da reta } r, \text{ então, } m = \frac{6-0}{0-3} = -2.$$

$$\text{Seja } m' \text{ o declive da reta } s, \text{ então } m' = \frac{1-0}{0-(-4)} = \frac{1}{4}.$$

Designemos por α e θ as inclinações, em graus, das retas r e s , respetivamente.

$$\tan \alpha = -2 \wedge \alpha \in]90^\circ, 180^\circ[\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \arctan(-2) \wedge \alpha \in]90^\circ, 180^\circ[, \text{ logo}$$

$$\alpha = 180^\circ - \arctan(2) \approx 116,57^\circ.$$

Por outro lado:

$$\tan \theta = \frac{1}{4} \wedge \theta \in]0^\circ, 90^\circ[\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \theta = \arctan\left(\frac{1}{4}\right) \wedge \theta \in]0^\circ, 90^\circ[$$

$$\text{Logo, } \theta = \arctan\left(\frac{1}{4}\right) \approx 14,04^\circ.$$

Assim, $\widehat{ACE} = \theta \approx 14,04^\circ$.

$$\widehat{EAC} = 180^\circ - \alpha \approx 63,43^\circ$$

$$\widehat{CEA} = 180^\circ - \widehat{ACE} - \widehat{EAC} \approx 102,53^\circ$$

$$13.1. \quad (2\vec{u})\vec{v} = 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\widehat{u, v}) = \sqrt{2} \times \sqrt{8} \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \\ = \sqrt{2} \times \sqrt{8} \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{16} \left(-\cos \frac{\pi}{3}\right) = 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$$

$$\text{Logo, } 2\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times (-1) = -2.$$

$$13.2. \quad (-\sqrt{2}\vec{u})(\sqrt{18}\vec{v}) = -\sqrt{2} \times \sqrt{18} \vec{u} \cdot \vec{v} = \\ = -\sqrt{36} \times (-1) = 6$$

$$13.3. \quad (\sqrt{8}\vec{u} - \vec{v}) \cdot 2\vec{v} = 2\sqrt{8}(\vec{u} \cdot \vec{v}) - 2(\vec{v} \cdot \vec{v}) = \\ = 4\sqrt{2}(\vec{u} \cdot \vec{v}) - 2\|\vec{v}\|^2 = \\ = 4\sqrt{2} \times (-1) - 2 \times (\sqrt{8})^2 = -4\sqrt{2} - 2 \times 8 = \\ = -4\sqrt{2} - 16 = -4\sqrt{2} - 16 = -8\sqrt{2}$$

$$13.4. \quad (2\vec{u} + 2\vec{v}) \cdot (3\vec{u} - 3\vec{v}) = \\ = 2 \times 3 \times (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \\ = 6 \times (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \\ = 6 \times (\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) = \\ = 6 \times \left((\sqrt{2})^2 - (\sqrt{8})^2\right) = \\ = 6 \times (2 - 8) = -6 \times 6 = -36$$

$$14.1. \quad \overline{AB} \cdot \overline{AC} = \|\overline{AB}\| \|\overline{AC}\| \cos(\widehat{AB, AC}) = \\ = 3 \times 4 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 3 \times 4 \times \frac{1}{2} = 6$$

14.2. Temos que $\overline{AC} = \overline{AB}$, pelo que $\widehat{ACB} = \widehat{CBA}$, logo $\widehat{CBA} = 30^\circ$ e, consequentemente, $\widehat{BAC} = 180^\circ - 2 \times 30^\circ = 120^\circ$.

$$\overline{AB} \cdot \overline{AC} = \|\overline{AB}\| \|\overline{AC}\| \cos(\widehat{AB, AC}) = \\ = 3 \times 3 \times \cos 120^\circ = 3 \times 3 \times \cos(180^\circ - 60^\circ) = \\ = 3 \times 3 \times (-\cos 60^\circ) = 3 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{9}{2}$$

2.1. Declive e inclinação de uma reta. Produto escalar

$$\begin{aligned}
 15.1. \quad \overline{AM} \cdot \overline{CM} &= \|\overline{AM}\| \|\overline{CM}\| \cos(\widehat{AM, CM}) \\
 &= 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} \cos 180^\circ = \\
 &= 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} \times (-1) = -8
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 15.2. \quad 2\overline{CB} \cdot \overline{MB} &= 2\|\overline{CB}\| \|\overline{MB}\| \cos(\widehat{CB, MB}) \\
 &= 2 \times 4 \times 2\sqrt{2} \cos 45^\circ = \\
 &= 2 \times 4 \times 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 16
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 15.3. \quad \overline{AB} \cdot (\overline{AC} + \overline{BC}) &= \overline{AB} \cdot \overline{AC} + \overline{AB} \cdot \overline{BC} \\
 &= \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cos(\widehat{AB, AC}) + 0 = \\
 &= 4 \times 4\sqrt{2} \cos 45^\circ = \\
 &= 4 \times 4\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 16
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 15.4. \quad \overline{BA} \cdot \overline{BD} &= \|\overline{BA}\| \|\overline{BD}\| \cos(\widehat{BA, BD}) = \\
 &= 4 \times 4\sqrt{2} \times \cos 45^\circ = \\
 &= 4 \times 4\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 16
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 16. \quad \overline{RP} \cdot \overline{RQ} &= (\overline{RM} + \overline{MP}) \cdot (\overline{RM} + \overline{MQ}) = \\
 &= \overline{RM} \cdot \overline{RM} + \overline{RM} \cdot \overline{MQ} + \overline{MP} \cdot \overline{RM} + \overline{MP} \cdot \overline{MQ} = \\
 &= \|\overline{RM}\|^2 + \overline{RM} \cdot (\overline{MQ} + \overline{MP}) + \overline{MP} \cdot (-\overline{QM}) = \\
 &= \|\overline{RM}\|^2 + \overline{RM} \cdot \vec{0} - \overline{MP} \cdot \overline{QM} = \\
 &= \|\overline{RM}\|^2 - \overline{MP} \cdot \overline{MP} = \\
 &= a^2 - \|\overline{MP}\|^2 = a^2 - 4^2 = a^2 - 16
 \end{aligned}$$

Ficha para praticar 8

Págs. 38 a 41

$$1.1. \quad \text{a) } \overline{AB} = B - A = (5, 3) - (-2, -4) = (7, 1)$$

$$\overline{BC} = C - B = (0, -3) - (5, -3) = (-5, 0)$$

Tem-se, ainda, que $\overline{AB} + \vec{e}_2 = (7, 1) + (0, 1) = (7, 2)$,

pelo que:

$$(\overline{AB} + \vec{e}_2) \cdot \overline{BC} = (7, 2) \cdot (-5, 0) = 7 \times (-5) + 2 \times 0 = -35$$

$$\text{b) } \overline{AB} = (7, 1) \text{ e } \overline{BC} = (-5, 0), \text{ pelo que}$$

$$\overline{BC} - \overline{AB} = (-5, 0) - (7, 1) = (-12, -1)$$

Por outro lado:

$$\overline{AC} = C - A = (0, -3) - (-2, -4) = (2, 1)$$

Assim:

$$(\overline{BC} - \overline{AB}) \cdot \overline{AC} = (-12, -1) \cdot (2, 1) =$$

$$= -12 \times 2 + (-1) \times 1$$

$$= -24 - 1 = -25$$

$$1.2. \quad \text{a) O ponto } P \text{ pertence à reta de equação } y = x - 1, \text{ pelo que as suas coordenadas são da forma } (x, x - 1).$$

Por outro lado, se $\overline{OP}$ é perpendicular a $\overline{AB}$, então

$$\overline{OP} \cdot \overline{AB} = 0.$$

Assim, vem:

$$\overline{OP} = P - O = (x, x - 1) \text{ e } \overline{AB} = (7, 1)$$

$$(x, x - 1) \cdot (7, 1) = 0 \Leftrightarrow 7x + x - 1 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 8x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{8}$$

Portanto, $P\left(\frac{1}{8}, \frac{1}{8} - 1\right)$, ou seja, $P\left(\frac{1}{8}, -\frac{7}{8}\right)$.

b) P pertence à bissetriz dos quadrantes pares quando as suas coordenadas são simétricas, ou seja:

$$P(x, -x), x \in \mathbb{R}$$

Assim:

$$\overline{OP} = P - O = (x, -x)$$

$$\overline{AC} = (2, 1)$$

Portanto,

$$\overline{OP} \cdot \overline{AC} = 2 \Leftrightarrow (x, -x) \cdot (2, 1) = 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x - x = 2 \Leftrightarrow x = 2$$

Então, $P(2, -2)$.

$$\begin{aligned}
 2.1. \quad \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{(2, -3) \cdot (1, 4)}{\sqrt{2^2 + (-3)^2} \times \sqrt{1^2 + 4^2}} = \\
 &= \frac{2 \times 1 + (-3) \times 4}{\sqrt{13} \times \sqrt{17}} = \frac{-10}{\sqrt{221}}
 \end{aligned}$$

$$\text{Logo, } (\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \arccos\left(-\frac{10}{\sqrt{221}}\right) \approx 132,3^\circ$$

$$\begin{aligned}
 2.2. \quad \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{(-2, 3) \cdot (-3, 1)}{\sqrt{(2)^2 + 3^2} \times \sqrt{(-3)^2 + 1^2}} = \\
 &= \frac{-2 \times (-3) + 3 \times 1}{\sqrt{13} \times \sqrt{10}} = \frac{9}{\sqrt{130}}
 \end{aligned}$$

$$\text{Logo, } (\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \arccos\left(\frac{9}{\sqrt{130}}\right) \approx 37,9^\circ.$$

$$\begin{aligned}
 2.3. \quad \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{(\sqrt{6}, \sqrt{2}) \cdot (-1, \sqrt{3})}{\sqrt{\sqrt{6}^2 + \sqrt{2}^2} \times \sqrt{(-1)^2 + \sqrt{3}^2}} = \\
 &= \frac{-\sqrt{6} + \sqrt{2} \times \sqrt{3}}{\sqrt{8} \times \sqrt{4}} = \frac{-\sqrt{6} + \sqrt{6}}{2\sqrt{8}} = 0
 \end{aligned}$$

$$\text{Logo } (\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = 90,0^\circ$$

$$\begin{aligned}
 2.4. \quad \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{\left(\frac{1}{2}, -1\right) \cdot \left(1, -\frac{1}{4}\right)}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + (-1)^2} \times \sqrt{1^2 + \left(-\frac{1}{4}\right)^2}} = \\
 &= \frac{\frac{1}{2} \times 1 + (-1) \times \left(-\frac{1}{4}\right)}{\sqrt{\frac{5}{4}} \times \sqrt{\frac{17}{16}}} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{85}{64}}} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{85}}{8}} = \frac{6}{\sqrt{85}}
 \end{aligned}$$

$$\text{Logo, } (\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \arccos\left(\frac{6}{\sqrt{85}}\right) \approx 49,4^\circ.$$

2.1. Declive e inclinação de uma reta. Produto escalar

$$3. \quad \overline{BA} \cdot \overline{BC} = (1, 3, -1) \cdot (2, -1, 2) = 2 - 3 - 2 = -3$$

Como $\overline{BA} \cdot \overline{BC} < 0$, o ângulo CBA é obtuso.

Portanto, como o ângulo de vértice B do triângulo é obtuso, o triângulo $[ABC]$ é obtusângulo.

4. Os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são perpendiculares se e somente se $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Assim:

$$(1, k-2, 5) \cdot (5, k+2, -2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5 + (k-2)(k+2) - 10 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k^2 - 4 - 5 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k = 3 \vee k = -3$$

Portanto, $k = -3$ ou $k = 3$.

$$5.1. \quad r: 4x - 5y - 2 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{4}{5}x - \frac{2}{5}$$

A reta r tem declive igual a $\frac{4}{5}$.

Como a reta s é perpendicular à reta r , o seu declive, m' , é tal que $m \times m' = -1$, portanto:

$$\frac{4}{5} \times m' = -1 \Leftrightarrow m' = -\frac{5}{4}$$

Portanto, a reta s é do tipo $y = -\frac{5}{4}x + b$.

O ponto $B(2, -5)$ pertence à reta s , pelo que:

$$-5 = -\frac{5}{4} \times 2 + b \Leftrightarrow -5 = -\frac{5}{2} + b \Leftrightarrow b = -5 + \frac{5}{2} \Leftrightarrow b = -\frac{5}{2}$$

Assim, a equação reduzida da reta s é $y = -\frac{5}{4}x - \frac{5}{2}$.

5.2. $C(0, y)$

$$\overline{AB} = B - A = (2, -5) - (-3, 4) = (5, -9)$$

$$\overline{AC} = C - A = (0, y) - (-3, 4) = (3, y-4)$$

O triângulo $[ABC]$ é retângulo em A se e só se $\overline{AB} \cdot \overline{AC} = 0$.

$$\overline{AB} \cdot \overline{AC} = 0 \Leftrightarrow (5, -9) \cdot (3, y-4) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 15 - 9 \times (y-4) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 15 - 9y + 36 = 0 \Leftrightarrow 9y = 51 \Leftrightarrow y = \frac{51}{9} \Leftrightarrow y = \frac{17}{3}$$

O ponto C tem coordenadas $\left(0, \frac{17}{3}\right)$.

$$6.1. \quad (2, 3, 1) = (2, 6, -2) + \lambda(0, 1, -1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 2 \\ 3 = 6 + \lambda \Leftrightarrow \lambda = -3 \\ 1 = -2 - \lambda \end{cases}$$

Logo, $A(2, 3, 1) \in r$.

$$(2, 5, -1) = (2, 6, -2) + \lambda(0, 1, -1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 2 \\ 5 = 6 + \lambda \Leftrightarrow \lambda = -1 \\ -1 = -2 - \lambda \end{cases}$$

Logo, $B(2, 5, -1) \in r$

6.2. Seja α o plano mediador de $[AB]$ e $P(x, y, z)$ um ponto de α .

$$M\left(\frac{2+2}{2}, \frac{3+5}{2}, \frac{1+(-1)}{2}\right) = M(2, 4, 0) \text{ é o ponto médio}$$

de $[AB]$.

$$\overline{MP} \cdot \overline{AB} = 0 \Leftrightarrow (x-2, y-4, z) \cdot (0, 2, -2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2y - 8 - 2z = 0 \Leftrightarrow y - z = 4$$

$$\alpha: y - z = 4$$

6.3. O ponto C se existir, é equidistante dos pontos A e B . Logo, C terá de pertencer ao plano mediador de $[AB]$.

Por outro lado, como C pertence à reta s , é da forma

$$C(-5+k, k, 6-k) \text{ com } k \in \mathbb{R}.$$

Determinemos k sabendo que $k \in \alpha: y - z = 4$.

$$k - (6-k) = 4 \Leftrightarrow k = 5$$

Portanto, $C(-5+5, 5, 6-5) = C(0, 5, 1)$.

Sabemos que $\overline{AC} = \overline{BC}$ porque C pertence ao plano mediador de $[AB]$. Falta verificar que $\overline{AC} = \overline{AB}$:

$$\overline{AC} = \sqrt{(0-2)^2 + (5-3)^2 + (1-1)^2} = \sqrt{4+4+0} = \sqrt{8}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(0-2)^2 + (5-5)^2 + (1-1)^2} = \sqrt{4+0+0} = \sqrt{4}$$

Como $\overline{AC} = \overline{AB} = \overline{BC}$ o triângulo $[ABC]$ é equilátero.

O ponto C tem coordenadas $(0, 5, 1)$.

$$7.1. \quad r: 2x - 5y - 1 = 0 \Leftrightarrow 5y = 2x - 1 \Leftrightarrow y = \frac{2}{5}x - \frac{1}{5}$$

Portanto, o declive da reta r é $\frac{2}{5}$.

Como a reta s é perpendicular à reta r , o seu declive, m' , é tal que $m \times m' = -1$, ou seja:

$$\frac{2}{5} \times m' = -1 \Leftrightarrow m' = -\frac{5}{2}$$

Portanto, a reta s é do tipo $y = -\frac{5}{2}x + b$.

O ponto $A(2, -1)$ pertence à reta s , pelo que:

$$-1 = -\frac{5}{2} \times 2 + b \Leftrightarrow -1 = -5 + b \Leftrightarrow b = 4$$

Assim, a equação reduzida da reta s é $y = -\frac{5}{2}x + 4$.

7.2. Seja $P(x, y)$ as coordenadas de um ponto qualquer da reta tangente à circunferência no ponto Q , então:

$$\overline{QR} \cdot \overline{QP} = 0$$

Tem-se que:

$$\overline{QR} = R - Q = (-4, 3) - (-3, -2) = (-1, 5)$$

$$\overline{QP} = P - Q = (x, y) - (-3, -2) = (x+3, y+2)$$

Assim:

$$\overline{QR} \cdot \overline{QP} = 0 \Leftrightarrow (-1, 5) \cdot (x+3, y+2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -x - 3 + 5y + 10 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5y = x - 7 \Leftrightarrow y = \frac{1}{5}x - \frac{7}{5}$$

2.1. Declive e inclinação de uma reta. Produto escalar

A equação pedida é $y = \frac{1}{5}x - \frac{7}{5}$.

8.1. Seja M o ponto médio do segmento $[AB]$.

Então, $M\left(\frac{5+3}{2}, \frac{-2+0}{2}, \frac{1-1}{2}\right)$, ou seja, $M(4, -1, 0)$.

Por outro lado:

$$\overline{AB} = B - A = (3, 0, -1) - (5, -2, 1) = (-2, 2, -2)$$

Seja $P(x, y, z)$ um ponto qualquer do plano mediador de $[AB]$, então:

$$\overline{MP} \cdot \overline{AB} = 0 \Leftrightarrow (x-4, y+1, z) \cdot (-2, 2, -2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2(x-4) + 2(y+1) - 2z = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2x + 8 + 2y + 2 - 2z = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2x + 2y - 2z + 10 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x - y + z - 5 = 0$$

Assim, uma equação do plano mediador de $[AB]$ é $x - y + z - 5 = 0$.

8.2. Seja $P(x, y, z)$ um ponto qualquer do plano tangente à

superfície esférica de centro $C(1, 2, 1)$ no ponto B . Então:

$$\overline{BP} \cdot \overline{BC} = 0$$

$$\overline{BP} = P - B = (x, y, z) - (3, 0, -1) = (x-3, z+1)$$

$$\overline{BC} = C - B = (1, 2, 1) - (3, 0, -1) = (-2, 2, 2)$$

Assim:

$$(x-3, y, z+1) \cdot (-2, 2, 2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2(x-3) + 2y + 2(z+1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2x + 6 + 2y + 2z + 2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2x + 2y + 2z + 8 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x - y - z - 4 = 0$$

Portanto, a equação pedida é $x - y - z - 4 = 0$

8.3. Seja $P(x, y, z)$ um ponto qualquer da superfície esférica de diâmetro $[AB]$.

Então, $\overline{AP} \cdot \overline{BP} = 0$.

$$\overline{AP} = P - A = (x, y, z) - (5, -2, 1) = (x-5, y+2, z-1)$$

$$\overline{BP} = P - B = (x, y, z) - (3, 0, -1) = (x-3, y, z+1)$$

Assim:

$$(x-5, y+2, z-1) \cdot (x-3, y, z+1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-5)(x-3) + (y+2)y + (z-1)(z+1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x - 5x + 15 + y^2 + 2y + z^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 2y + 14 = 0$$

Portanto, uma equação da superfície esférica de diâmetro $[AB]$ é $x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 2y + 14 = 0$.

9.1. Substituindo as coordenadas do ponto $T(-3, -2)$ na

equação da circunferência:

$$(-3+1)^2 + (-2+6)^2 = 20 \Leftrightarrow (-2)^2 + 4^2 = 20 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4 + 16 = 20 \Leftrightarrow 20 = 20 \text{ (verdade)}$$

Portanto, o ponto T pertence à circunferência.

9.2. Seja $P(x, y)$ um ponto qualquer da reta tangente à

circunferência no ponto T , então:

$\overline{CT} \cdot \overline{TP} = 0$, sendo C o centro da circunferência.

$$\overline{CT} = T - C = (-3, -2) - (-1, -6) = (-2, 4)$$

$$\overline{TP} = P - T = (x, y) - (-3, -2) = (x+3, y+2)$$

Assim:

$$(-2, 4) \cdot (x+3, y+2) = 0 \Leftrightarrow -2(x+3) + 4(y+2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2x - 6 + 4y + 8 = 0 \Leftrightarrow 4y = 2x - 2 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$$

O declive desta reta é $\frac{1}{2}$, pelo que $\vec{i}(2, 1)$ é um vetor

diretor.

Por outro lado, sabe-se que o ponto $T(-3, -2)$ pertence à reta. Portanto, uma equação vetorial da reta pedida é:

$$(x, y) = (-3, -2) + k(2, 1), k \in \mathbb{R}$$

9.3. Determinemos as coordenadas dos pontos A e B .

$$(x+1)^2 + (y+6)^2 = 20 \wedge x = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (1+1)^2 + (y+6)^2 = 20 \wedge x = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4 + (y+6)^2 = 20 \wedge x = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (y+6)^2 = 16 \wedge x = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (y+6 = 4 \vee y+6 = -4) \wedge x = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (y = -2 \vee y = -10) \wedge x = 1$$

Portanto, $A(1, -2)$ e $B(1, -10)$ ou $A(1, -10)$ e

$B(1, -2)$.

Por outro lado:

$$\overline{CA} = A - C = (1-2) - (-1, -6) = (2, 4)$$

$$\overline{CB} = B - C = (1, -10) - (-1, -6) = (2, -4)$$

$$\cos \hat{ACB} = \cos(\widehat{CA, CB}) = \frac{\overline{CA} \cdot \overline{CB}}{\|\overline{CA}\| \|\overline{CB}\|} =$$

$$= \frac{(2, 4) \cdot (2, -4)}{\sqrt{2^2 + 4^2} \times \sqrt{2^2 + (-4)^2}} = \frac{2 \times 2 + 4 \times (-4)}{\sqrt{20} \times \sqrt{20}} =$$

$$= \frac{-12}{20} = -\frac{12}{20} = -\frac{3}{5}$$

Portanto, $\hat{ACB} = \arccos\left(-\frac{3}{5}\right) \approx 2,21$ rad.

O ângulo ACB tem amplitude, aproximadamente, igual a 2,21 rad.

10. $r: 3x + y = 4 \Leftrightarrow y = -3x + 4$

$$-3x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{4}{3}$$

$$A\left(\frac{4}{3}, 0\right)$$

$$s: y = -\frac{4}{5}x + 3$$

$$-\frac{4}{5}x + 3 = 0 \Leftrightarrow -4x + 15 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{15}{4}$$

$$B\left(\frac{15}{4}, 0\right)$$

2.1. Declive e inclinação de uma reta. Produto escalar

$$\widehat{B\hat{A}C} = \alpha = \text{inclinação de } r = 180^\circ - \arctan(3) \approx 108,4^\circ$$

$$\widehat{C\hat{B}A} = 180^\circ - \beta = 180^\circ - \text{inclinação de } s =$$

$$= 180^\circ - \left(180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{4}{5}\right) \right) \approx 38,7^\circ$$

$$\widehat{A\hat{C}B} = 180^\circ - 108,4^\circ - 38,7^\circ \approx 32,9^\circ$$

$$\widehat{B\hat{A}C} \approx 108,4^\circ, \widehat{C\hat{B}A} \approx 38,7^\circ \text{ e } \widehat{A\hat{C}B} \approx 32,9^\circ$$

11. $4x - 3y - 2 = 0 \Leftrightarrow 3y = 4x - 2 \Leftrightarrow y = \frac{4}{3}x - \frac{2}{3}$. O declive da reta r é $\frac{4}{3}$, pelo que $\vec{r}(3, 4)$ é um vetor diretor da reta r .

Seja $P(x, y)$ um ponto genérico da reta s .

$$\overline{AP} = P - A = (x, y) - (1, -3) = (x-1, y+3)$$

$$\overline{AP} \cdot \vec{r} = 0 \Leftrightarrow (x-1, y+3) \cdot (3, 4) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3x - 3 + 4y + 12 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4y = -3x - 9 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y = -\frac{3}{4}x - \frac{9}{4}$$

Portanto, $y = -\frac{3}{4}x - \frac{9}{4}$ é a equação reduzida da reta s .

- 12.1. a) Seja $P(x, y)$ um ponto genérico da circunferência de diâmetro $[AC]$.

$$\overline{AP} \cdot \overline{CP} = 0 \Leftrightarrow (x+2, y-3) \cdot (x-1, y+1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x+2)(x-1) + (y-3)(y+1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x + 2x - 2 + y^2 + y - 3y - 3 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + x - 2y - 5 = 0$$

Portanto, $x^2 + y^2 + x - 2y - 5 = 0$ é uma equação da circunferência de diâmetro $[AC]$.

- b) Seja $P(x, y)$ um ponto genérico da mediatriz do segmento de reta $[AB]$ e M o ponto médio deste segmento.

$$M\left(\frac{-2-1}{2}, \frac{3+4}{2}\right), \text{ ou seja, } M\left(-\frac{3}{2}, \frac{7}{2}\right).$$

$$\overline{AB} \cdot \overline{MP} = 0 \Leftrightarrow (1, 1) \cdot \left(x + \frac{3}{2}, y - \frac{7}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x + \frac{3}{2} + y - \frac{7}{2} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x + y - 2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y = -x + 2$$

Portanto, $y = -x + 2$ é a equação reduzida da mediatriz do segmento de reta $[AB]$.

- c) Seja $P(x, y)$ um ponto genérico da reta t .

$$\overline{AP} \cdot \overline{BC} = 0 \Leftrightarrow (x+2, y-3) \cdot (2, -5) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2(x+2) - 5(y-3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2(x+2) - 5(y-3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x + 4 - 5y + 15 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5y = 2x + 19 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{2}{5}x + \frac{19}{5}$$

Logo, $y = \frac{2}{5}x + \frac{19}{5}$ é a equação reduzida da reta t .

$$12.2. \overline{AC} = C - A = (1, -1) - (-2, 3) = (3, -4)$$

Portanto, $(4k, 3k)$, $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ são as coordenadas dos

vetores, não nulos, perpendiculares ao vetor $\overline{AC}$. Como se pretende que tenha norma 10, temos:

$$\|(4k, 3k)\| = 10 \Leftrightarrow \sqrt{(4k)^2 + (3k)^2} = 10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{16k^2 + 9k^2} = 10 \Leftrightarrow \sqrt{25k^2} = 10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5|k| = 10 \Leftrightarrow |k| = 2 \Leftrightarrow k = -2 \vee k = 2$$

Logo, $(8, 6)$ e $(-8, -6)$ são as coordenadas dos vetores de norma 10 perpendiculares ao vetor $\overline{AC}$.

- 13.1. Seja $\vec{n}(a, b, c)$, com a, b e $c \in \mathbb{R}$, não nulo, um vetor normal a $\vec{v}$.

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow (-1, 2, 1) \cdot (a, b, c) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -a + 2b + c = 0 \Leftrightarrow c = a - 2b$$

Logo, $\vec{n}(a, b, a - 2b)$, a e $b \in \mathbb{R}$ não simultaneamente nulos.

Por exemplo:

$$\text{Para } a = 1 \text{ e } b = 1, \text{ temos } \vec{n}(1, 1, -1).$$

$$\text{Para } a = 0 \text{ e } b = 1, \text{ temos } \vec{n}(0, 1, -2).$$

$$\text{Para } a = 1 \text{ e } b = 0, \text{ temos } \vec{n}(1, 0, 1).$$

Por exemplo: $\vec{n}_1(1, 1, -1)$, $\vec{n}_2(0, 1, -2)$ e $\vec{n}_3(1, 0, 1)$.

- 13.2. Seja $\vec{n}(a, b, c)$, com a, b e $c \in \mathbb{R}$, um vetor normal a $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

$$\begin{cases} \vec{v} \cdot \vec{n} = 0 \\ \vec{w} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (-1, 2, 1) \cdot (a, b, c) = 0 \\ (-3, 1, 0) \cdot (a, b, c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -a + 2b + c = 0 \\ -3a + b = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -a + 2 \times 3a + c = 0 \\ b = 3a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -5a \\ b = 3a \end{cases}$$

Logo, $\vec{n}(a, 3a, -5a)$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Por exemplo, se $a = 1$, $\vec{n}(1, 3, -5)$ é perpendicular aos vetores $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

Portanto, $\vec{u}(1, 3, -5)$, por exemplo.

- 14.1. Os vetores $\overline{AB}$ e $\vec{v}$ são perpendiculares quando e apenas quando $\overline{AB} \cdot \vec{v} = 0$.

Temos que:

$$\overline{AB} = B - A = (-1, 0, 3) - (3, -5, 2) = (-4, 5, 1).$$

2.1. Declive e inclinação de uma reta. Produto escalar

$$\overline{AB} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow (-4, 5, 1) \cdot (k^2 - k, 1 + 2k, -2 - 3k) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -4(k^2 - k) + 5(1 + 2k) + (-2 - 3k) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -4k^2 + 4k + 5 + 10k - 2 - 3k = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -4k^2 + 11k + 3 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{-11 \pm \sqrt{11^2 - 4(-4) \times 3}}{2 \times (-4)} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{-11 \pm \sqrt{169}}{-8} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{-11 + 13}{-8} \vee k = \frac{-11 - 13}{-8} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k = -\frac{1}{4} \vee k = 3$$

Portanto, $k = -\frac{1}{4} \vee k = 3$.

14.2. $\overline{OA}(3, -5, 2)$ e $\overline{OB}(-1, 0, 3)$

$$\cos(\widehat{AOB}) = \cos(\widehat{\overline{OA}, \overline{OB}}) = \frac{\overline{OA} \cdot \overline{OB}}{\|\overline{OA}\| \|\overline{OB}\|} =$$

$$= \frac{(3, -5, 2) \cdot (-1, 0, 3)}{\sqrt{9 + 25 + 4} \sqrt{1 + 0 + 9}} = \frac{-3 + 0 + 6}{\sqrt{38} \sqrt{10}} =$$

$$= \frac{3}{\sqrt{380}}$$

$$\widehat{AOB} = \arccos\left(\frac{3}{\sqrt{380}}\right) \approx 81,1^\circ$$

15.1. $M\left(\frac{-3+1}{2}, \frac{2-4}{2}, \frac{4+2}{2}\right) = (-1, -1, 3)$

$$\overline{AB} = B - A = (1, -4, 2) - (-3, 2, 4) = (4, -6, -2)$$

$$\overline{MP} = P - M = (x, y, z) - (-1, -1, 3) = (x+1, y+1, z-3)$$

$$\overline{AB} \cdot \overline{MP} = 0 \Leftrightarrow (4, -6, -2) \cdot (x+1, y+1, z-3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4x + 4 - 6y - 6 - 2z + 6 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4x - 6y - 2z + 4 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x - 3y - z + 2 = 0$$

O lugar geométrico é o plano medidor do segmento de reta $[AB]$ de equação $2x - 3y - z + 2 = 0$.

15.2. $\overline{AP} = P - A = (x, y, z) - (-3, 2, 4) = (x+3, y-2, z-4)$

$$\overline{BP} = P - B = (x, y, z) - (1, -4, 2) = (x-1, y+4, z-2)$$

$$\overline{AP} \cdot \overline{BP} = 0 \Leftrightarrow (x+3, y-2, z-4) \cdot (x-1, y+4, z-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+3)(x-1) + (y-2)(y+4) + (z-4)(z-2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x + 3x - 3 + y^2 + 4y - 2y - 8 + z^2 - 2z - 4z + 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x + y^2 + 2y + z^2 - 6z = 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 + y^2 + 2y + 1 + z^2 - 6z + 9 = 3 + 1 + 1 + 9 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 14$$

O lugar geométrico é uma superfície esférica de centro no ponto de coordenadas $(-1, -1, 3)$ e raio $\sqrt{14}$.

16.1. $x^2 - x + y^2 + 2y + z^2 - 4z = \frac{15}{4} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow x^2 - x + \frac{1}{4} + y^2 + 2y + 1 + z^2 - 4z + 4 = \frac{15}{4} + \frac{1}{4} + 1 + 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$$

A superfície esférica tem centro no ponto de coordenadas

$$C\left(\frac{1}{2}, -1, 2\right).$$

16.2. Seja $P(x, y, z)$ um ponto qualquer do plano α .

$$\overline{AP} = P - A = (x, y, z) - \left(\frac{1}{2}, -1, 5\right) = \left(x - \frac{1}{2}, y+1, z-5\right)$$

$$\overline{CA} = A - C = \left(\frac{1}{2}, -1, -5\right) - \left(\frac{1}{2}, -1, 2\right) = (0, 0, 3)$$

$$\overline{AP} \cdot \overline{CA} = 0 \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}, y+1, z-5\right) \cdot (0, 0, 3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3(z-5) = 0 \Leftrightarrow z-5 = 0 \Leftrightarrow z = 5$$

Portanto, $z = 5$ é uma equação do plano α .

17. $\overline{AB} = 12$ e $B(3, 8, 0)$, pelo que $A(3, -4, 0)$.

Como $\overline{BC} = 3$ e $\overline{BC} = \overline{CG}$, então $\overline{CG} = 3$.

Portanto, $I(3, 6, 3)$.

$$\overline{IA} = A - I = (3, -4, 0) - (3, 6, 3) = (0, -10, -3)$$

$$\overline{IC} = C - I = (0, 8, 0) - (3, 6, 3) = (-3, 2, -3)$$

$$\|\overline{IA}\| = \sqrt{0^2 + (-10)^2 + (-3)^2} = \sqrt{100 + 9} = \sqrt{109}$$

$$\|\overline{IC}\| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{9 + 4 + 9} = \sqrt{22}$$

$$\overline{IA} \cdot \overline{IC} = (0, -10, -3) \cdot (-3, 2, -3) =$$

$$= 0 \times (-3) + (-10) \times 2 + (-3) \times (-3) = -11$$

α é o ângulo formado pelos vetores $\overline{IA}$ e $\overline{IC}$, pelo que

$$\cos \alpha = \cos(\widehat{\overline{IA}, \overline{IC}}) = \frac{\overline{IA} \cdot \overline{IC}}{\|\overline{IA}\| \|\overline{IC}\|} = \frac{-11}{\sqrt{109} \times \sqrt{22}} = \frac{-11}{\sqrt{2398}}$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \tan^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

Logo, temos que o valor exato de $\tan^2 \alpha$ é:

$$\tan^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\left(\frac{-11}{\sqrt{2398}}\right)^2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \tan^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\frac{121}{2398}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \tan^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\frac{11}{218}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \tan^2 \alpha = \frac{218}{11} - 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \tan^2 \alpha = \frac{207}{11}$$

Portanto, $\tan^2 \alpha = \frac{207}{11}$.

2.1. Declive e inclinação de uma reta. Produto escalar

Ficha de teste 4

Págs. 42 e 43

$$1. \quad x = -\sqrt{3}y \Leftrightarrow y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x \Leftrightarrow y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$$

A inclinação α da reta r é tal que

$$\tan \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3} \wedge \alpha \in]90^\circ, 180^\circ[$$

$$\text{Portanto, } \alpha = 180^\circ - \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 150^\circ.$$

Resposta: (D)

$$2. \quad r: 6y + 2kx = 12 \Leftrightarrow 6y = -2kx + 12 \Leftrightarrow y = -\frac{k}{3}x + 2$$

Portanto, o declive da reta r é igual a $-\frac{k}{3}$, $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Por outro lado, tem-se que:

$$\begin{cases} -x = 1 + \lambda \\ 2y = 8\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = 4\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

Então, $\vec{t}(-1, 4)$ é um vetor diretor da reta t , pelo que, o declive desta reta é igual a -4 .

Como as retas r e t são perpendiculares, temos que:

$$-\frac{k}{3} \times (-4) = -1 \Leftrightarrow \frac{4k}{3} = -1 \Leftrightarrow k = -\frac{3}{4}.$$

Resposta: (D)

$$3. \quad \overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 \Leftrightarrow \overline{AC}^2 = a^2 + a^2 \Leftrightarrow \overline{AC}^2 = 2a^2 \text{ e como } \overline{AC} > 0, \text{ vem que } \overline{AC} = \sqrt{2a^2} \text{ e, sendo } a \in \mathbb{R}^+, \overline{AC} = \sqrt{2}a.$$

$$\text{Portanto, } \overline{EF} \cdot \overline{AC} = \|\overline{EF}\| \|\overline{AC}\| \cos(\widehat{EF, AC}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overline{EF} \cdot \overline{AC} = a \times \sqrt{2}a \times \cos(45^\circ) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overline{EF} \cdot \overline{AC} = \sqrt{2}a^2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \overline{EF} \cdot \overline{AC} = a^2$$

Resposta: (A)

4. Seja $P(x, y, z)$ um ponto qualquer da superfície esférica de diâmetro $[AB]$, então esta pode ser definida por $\overline{AP} \cdot \overline{BP} = 0$.

Assim:

$$\overline{AP} = P - A = (x, y, z) - (-2, 0, 1) = (x + 2, y, z - 1)$$

$$\overline{BP} = P - B = (x, y, z) - (2, 0, 4) = (x - 2, y, z - 4)$$

$$(x + 2, y, z - 1) \cdot (x - 2, y, z - 4) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x + 2)(x - 2) + y^2 + (z - 1)(z - 4) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4 + y^2 + z^2 - 4z - z + 4 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4z - z = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 5z = 0$$

A superfície esférica de diâmetro $[AB]$ pode ser definida pela equação $x^2 + y^2 + z^2 - 5z = 0$.

Resposta: (C)

5. A reta r tem declive $\sqrt{3}$.

A reta t tem declive $-\sqrt{3}$.

$$\sqrt{3} \neq -\sqrt{3} \text{ e } \sqrt{3} \times (-\sqrt{3}) \neq -1$$

As retas r e t são concorrentes não perpendiculares.

Resposta: (B)

$$6. \quad \widehat{BAH} = \frac{6 \times \frac{2\pi}{9}}{2} = \frac{2\pi}{3}$$

Assim:

$$\begin{aligned} \frac{\overline{AB} \cdot \overline{AH}}{\|\overline{AH}\|} &= \frac{\|\overline{AB}\| \times \|\overline{AH}\| \times \cos(\widehat{AB, AH})}{\|\overline{AH}\|} = \\ &= \|\overline{AB}\| \times \cos(\widehat{AB, AH}) = 1 \times \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \\ &= \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$7. \quad 2\vec{u} \cdot (-\vec{v} - 3\vec{u} + k\vec{u}) = -10 \Leftrightarrow -2\vec{u} \cdot \vec{v} - 6\vec{u} \cdot \vec{u} + 2k\vec{u} \cdot \vec{u} = -10$$

$$\Leftrightarrow -2\vec{u} \cdot \vec{v} - 6\|\vec{u}\|^2 + 2k\|\vec{u}\|^2 = -10$$

Como $\|\vec{u}\| = 3$ e $\vec{u} \cdot \vec{v} = -4$:

$$-2 \times (-4) - 6 \times 3^2 + 2k \times 3^2 = -10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 8 - 54 + 18k = -10 \Leftrightarrow -46 + 18k = -10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 18k = -10 + 46 \Leftrightarrow 18k = 36 \Leftrightarrow k = 2$$

Portanto, $k = 2$.

8. Como o ponto B tem coordenadas $(0, 4, 0)$, então de acordo com as indicações do enunciado, as coordenadas do ponto P são $(0, -4, z)$, $z \in \mathbb{R}^-$ (ordenada -4 porque tem ordenada igual à do ponto B e abcissa zero porque pertence ao plano yOz).

Portanto:

$$\overline{AB} = B - A = (0, -4, 0) - (3, 0, 0) = (-3, -4, 0)$$

$$\overline{AP} = P - A = (0, -4, z) - (3, 0, 0) = (-3, -4, z), z \in \mathbb{R}^-$$

$$\|\overline{AB}\| = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2 + 0^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\|\overline{AP}\| = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2 + z^2} = \sqrt{9 + 16 + z^2} = \sqrt{25 + z^2}, z \in \mathbb{R}^-$$

$$\overline{AB} \cdot \overline{AP} = (-3, -4, 0) \cdot (-3, -4, z) =$$

$$= 3 \times (-3) + (-4) \times (-4) + 0 \times z = 9 + 16 = 25$$

Temos, ainda, que o ângulo BAP é o ângulo formado pelos vetores $\overline{AB}$ e $\overline{AP}$ e que:

$$\cos(\widehat{AB, AP}) = \cos(\widehat{BAP}) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\overline{AB} \cdot \overline{AP} = \|\overline{AB}\| \times \|\overline{AP}\| \times \cos(\widehat{AB, AP}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 25 = 5 \times \sqrt{25 + z^2} \times \frac{1}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{25 \times 2}{5} = \sqrt{25 + z^2} \Leftrightarrow 10 = \sqrt{25 + z^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 10^2 = (\sqrt{25 + z^2})^2 \Leftrightarrow 100 = 25 + z^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow z^2 = 100 - 25 \Leftrightarrow z^2 = 75 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow z = -\sqrt{75} \vee z = \sqrt{75} \Leftrightarrow z = -5\sqrt{3} \vee z = 5\sqrt{3}$$

2.1. Declive e inclinação de uma reta. Produto escalar

- Como a cota do ponto P é negativa, temos que $z = -5\sqrt{3}$, isto é, a cota do ponto P é igual a $-5\sqrt{3}$.
9. As coordenadas dos pontos de interseção da circunferência com o eixo Oy são da forma $(0, y)$. Fazendo, $x = 0$ na equação da circunferência:
- $$(0+1)^2 + (y-2)^2 = 10 \Leftrightarrow 1 + (y-2)^2 = 10 \Leftrightarrow (y-2)^2 = 9$$
- $$\Leftrightarrow y-2 = -3 \vee y-2 = 3 \Leftrightarrow y = -1 \vee y = 5$$
- Como, o ponto A tem ordenada positiva, tem-se que $A(0, 5)$.
- Portanto, a circunferência contém o ponto $A(0, 5)$ e o seu centro é o ponto C , de coordenadas, $(-1, 2)$.
- Por outro lado, tem-se que a reta r é tangente à circunferência no ponto A , portanto é perpendicular ao segmento de reta $[AC]$.
- Assim, sendo $P(x, y)$ um ponto qualquer da reta r , a sua equação é dada por $\overline{AP} \cdot \overline{AC} = 0$.
- $$\overline{AP} = P - A = (x, y) - (0, 5) = (x, y-5) \text{ e}$$
- $$\overline{AC} = C - A = (-1, 2) - (0, 5) = (-1, -3)$$
- $$\overline{AP} \cdot \overline{AC} = 0 \Leftrightarrow (x, y-5) \cdot (-1, -3) = 0 \Leftrightarrow$$
- $$\Leftrightarrow -5x(y-5) \times (-3) = 0$$
- $$\Leftrightarrow -x-3y+15 = 0 \Leftrightarrow 3y = -x+15 \Leftrightarrow$$
- $$\Leftrightarrow y = -\frac{1}{3}x + 5$$
- Então, a equação reduzida da reta r é $y = -\frac{1}{3}x + 5$.

10. $B(0, 6, 0)$; $G(-3, 3, 8)$ e $E(3, 3, 8)$

Reta BG :

$$\overline{BG} = G - B = (-3, -3, 8)$$

$$BG: (x, y, z) = (0, 6, 0) + k(-3, -3, 8), k \in \mathbb{R}$$

O ponto P pertence a BG . Logo, é da forma $P(-3k, 6-3k, 8k)$.

O vetor $\overline{EP}$ é da forma:

$$\overline{EP} = P - E = (-3k-3, 3-3k, 8k-8)$$

Sabemos que $\overline{EP} \perp \overline{BG}$.

$$\overline{EP} \cdot \overline{BG} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (-3k-3, 3-3k, 8k-8) \cdot (-3, -3, 8) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 9k+9-9+9k+64k-64 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 82k = 64 \Leftrightarrow k = \frac{64}{82} \Leftrightarrow k = \frac{32}{41}$$

$$P\left(-3 \times \frac{32}{41}, 6-3 \times \frac{32}{41}, 8 \times \frac{32}{41}\right)$$

$$P\left(-\frac{96}{41}, \frac{150}{41}, \frac{256}{41}\right)$$

Ficha para praticar 9

Págs. 44 a 47

- 1.1.** Por exemplo, $\vec{n}(3, -1, 2)$ ou $\vec{n}(6, -2, 4)$
- 1.2.** $\alpha: z = -x + 3y - 10 \Leftrightarrow x - 3y + z + 10 = 0$
 Por exemplo, $\vec{n}(1, -3, 1)$ ou $\vec{n}(-1, 3, -1)$
- 1.3.** $\alpha: x - z = y \Leftrightarrow x - y - z = 0$
 Por exemplo, $\vec{n}(1, -1, -1)$ ou $\vec{n}(-3, 3, 3)$.
- 1.4.** $\alpha: x = 4 + 3z \Leftrightarrow x - 3z - 4 = 0$
 Por exemplo, $\vec{n}(1, 0, -3)$ ou $\vec{n}(2, 0, -6)$.
- 2.1.** Por exemplo, $\vec{n}(-1, 4, -2)$ e $A(3, 0, -1)$.
- 2.2.** Por exemplo, se $x = 0 \wedge z = 0$, vem que
 $2 \times 0 + 3y - 0 - 2 = 0 \Leftrightarrow 3y - 2 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{2}{3}$
 Portanto, $\vec{n}(2, 3, -1)$ e $A\left(0, \frac{2}{3}, 0\right)$.
- 2.3.** Por exemplo, $\vec{n}(-3, -1, -1)$.
 Se $x = -1$ e $y = -2$, vem que:
 $-3(-1+1) - (-2+2) - z - 4 = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow -3 \times 0 - 0 - z - 4 \Leftrightarrow -z - 4 = 0$
 $\Leftrightarrow z = -4$
 Portanto, $A(-1, -2, -4)$.
- 2.4.** Por exemplo, $\vec{n}(-3, 0, -2)$.
 Se $z = -4$, vem que:
 $-3x - 2(-4+4) = 0 \Leftrightarrow -3x - 2 \times 0 = 0 \Leftrightarrow -3x = 0 \Leftrightarrow x = 0$
 Portanto, $A(0, 0, -4)$.
- 3.** As equações cartesianas do plano α que passa pelo ponto $A(x_0, y_0, z_0)$ e tem como vetor normal $\vec{n}(a, b, c)$ é:
 $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$
- 3.1.** $3(x+3) + 1(y-2) - 2(z-0) = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow 3x + 9 + y - 2 - 2z = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow 3x + y - 2z + 7 = 0$
 Logo, $3x + y - 2z + 7 = 0$ é a equação geral do plano α .
- 3.2.** $-1(x-0) - 3(y-0) - 2(z+4) = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow -x - 3y - 2z - 8 = 0$
 Logo, $-x - 3y - 2z - 8 = 0$ é a equação geral do plano α .
- 3.3.** $0(x-3) + 4(y-1) - 3(z-2) = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow 4y - 4 - 3z + 6 = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow 4y - 3z + 2 = 0$
 Logo, $4y - 3z + 2 = 0$ é a equação geral do plano α .
- 3.4.** $0(x-4) - 4(y+1) - 0(z-0) = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow -4y - 4 = 0$
 Logo, $-4y - 4 = 0$ ou $y + 1 = 0$ é a equação geral do plano α .
- 4.** O plano α é definido pela equação $3x - y + 2z - 5 = 0$, pelo que $\vec{n}(3, -1, 2)$ é um vetor normal ao plano α .
 Assim, a reta que passa em $A(-3, 5, -1)$ é perpendicular a α tem a direção do vetor $\vec{n}(3, -1, 2)$.
 Portanto, uma equação vetorial desta reta é:
 $(x, y, z) = (-3, 5, -1) + k(3, -1, 2), k \in \mathbb{R}$

- 5.** A reta é perpendicular ao plano α se e somente se os vetores $\vec{r}$ e $\vec{n}$ forem colineares, sendo $\vec{r}$ um vetor diretor da reta r e $\vec{n}$ um vetor normal ao plano α .
 Tem-se, então, que $\vec{r}(4, 2, -1)$ e $\vec{n}(2, 1, -1)$, pelo que,
 como $\frac{4}{2} \neq \frac{-1}{-1}$, não existe um número real k tal que $\vec{r} = k\vec{n}$ e, portanto, o plano α não é perpendicular à reta r .
- 6.** $\vec{r}(-2, 1, 4)$ é um vetor diretor da reta r e $\vec{n}(2, -k, -4), k \in \mathbb{R}$ são vetores normais ao plano α .
 Por outro lado, a reta r e o plano α são perpendiculares se e somente se $\vec{r}$ é colinear com $\vec{n}$. Assim, vem que:
 $\vec{r}$ é colinear com $\vec{n}$ se e somente se $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \vec{n} = \lambda \vec{r}$.
 Portanto:
 $(2, -k, -4) = \lambda(-2, 1, 4) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (2, -k, -4) = (-2\lambda, \lambda, 4\lambda) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow -2\lambda = 2 \wedge \lambda = -k \wedge 4\lambda = -4 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \lambda = -1 \wedge \lambda = -k \wedge \lambda = -1 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \lambda = -1 \wedge \lambda = -k \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \lambda = -1 \wedge -1 = -k \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \lambda = -1 \wedge k = 1$
 Então, $k = 1$.
- 7.1.** Os planos ABE e CDF são paralelos, pelo que, os seus vetores normais são colineares.
 O plano ABE é definido pela equação $x + y + z - 3 = 0$, portanto, $\vec{n}_{ABE}(1, 1, 1)$, então $\vec{n}(1, 1, 1)$ é, também, um vetor normal ao plano CDF .
 Por outro lado, sabe-se que $D(0, -3, 0)$ é um ponto do plano CDF , logo, uma equação cartesiana deste plano é:
 $1(x-0) + 1(y+3) + 1(z-0) = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow x + y + 3 + z = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow x + y + z + 3 = 0$
 Assim, $x + y + z + 3 = 0$ é a equação geral do plano CDF .
- 7.2.** O plano ABE é definido pela equação $x + y + z - 3 = 0$, pelo que $\vec{n}(1, 1, 1)$ é um vetor normal a este plano. A reta que passa por $D(0, -3, 0)$ tem a direção do vetor $(1, 1, 1)$, portanto, uma equação vetorial desta reta é
 $(x, y, z) = (0, -3, 0) + k(1, 1, 1), k \in \mathbb{R}$.
- 8.1.** O ponto A pertence a um plano da família de planos definidos por $2x - ky - z - 1 = 0, k \in \mathbb{R}$, pelo que, substituindo as coordenadas no ponto $A(-3, 4, 1)$ na equação desta família de planos:
 $2 \times (-3) - k \times 4 - 1 - 1 = 0 \Leftrightarrow -6 - 4k - 2 = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow -4k = 8 \Leftrightarrow k = -2$
 Portanto, $k = -2$ pelo que a equação pedida é
 $2x + 2y - z - 1 = 0$.
- 8.2.** $\vec{r}(2, 1, -3)$ é um vetor diretor da reta r e $\vec{n}(2, -k, -1), k \in \mathbb{R}$ são vetores normais à família de planos dada.
 Por outro lado, tem-se que a reta r é paralela à família de planos dada se e somente se:
 $\vec{r} \perp \vec{n}$, ou seja, $\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$

2.2. Equações de planos no espaço

Assim, vem que:

$$\begin{aligned}(2, 1, -3) \cdot (2, -k, -1) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2 \times 2 + 1 \times (-k) + (-3) \times (-1) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4 - k + 3 = 0 &\Leftrightarrow k = 7\end{aligned}$$

9.1. $C(1, 2, 0)$ e $D(2, 1, 0)$

9.2. A reta r é perpendicular ao plano DCE .

A reta r passa na origem O referencial e no ponto $F(3, 3, 1)$.

O vetor $\overrightarrow{OF}$ de coordenadas $(3, 3, 1)$ é um vetor normal ao plano DCE , pois é um vetor diretor da reta r .

Portanto, o plano DCE pode ser definido por uma equação do tipo $3x + 3y + 3z + d = 0$.

Por outro lado, o ponto $C(1, 2, 0)$ pertence ao plano DCE ,

pelo que, substituindo as suas coordenadas na equação $3x + 3y + 3z + d = 0$, vem:

$$3 \times 1 + 3 \times 2 + 0 + d = 0 \Leftrightarrow 3 + 6 + d = 0 \Leftrightarrow d = -9$$

Assim, $3x + 3y + 3z - 9 = 0$ é a equação geral do plano DCE .

9.3. Seja β o plano pedido paralelo ao plano DCE . Assim, $\vec{n}(3, 3, 1)$ é um vetor normal ao plano β .

Como o ponto $A(1, 0, 0)$ pertence a β :

$$\begin{aligned}3(x-1) + 3(y-0) + 1(z-0) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3x - 3 + 3y + z &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3x + 3y + z - 3 &= 0\end{aligned}$$

Assim, $3x + 3y + z - 3 = 0$ é a equação geral do plano paralelo ao plano DCE e que passa por A .

9.4. A área da base da pirâmide é igual a $\|\overrightarrow{AB}\|^2$.

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (0, 1, 0) - (1, 0, 0) = (-1, 1, 0)$$

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$

$$\|\overrightarrow{AB}\|^2 = (\sqrt{2})^2 = 2.$$

A altura da pirâmide é igual à cota do ponto E .

O ponto E pertence ao plano DCE , cuja equação geral é $3x + 3y + 3z - 9 = 0$ e tem abcissa e ordenada iguais a 1.

Assim, a cota, z , do ponto E satisfaz a equação:

$$3 \times 1 + 3 \times 1 + z - 9 = 0 \Leftrightarrow 3 + 3 + z - 9 = 0 \Leftrightarrow z = 3$$

Portanto, a cota do ponto E é 3.

$$\text{Então, o volume da pirâmide é } \frac{2 \times 3}{3} = 2.$$

10.1. Vetor normal ao plano mediador de $[AB]$:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-3, 0, 1) - (0, -2, 1) = (-3, 2, 0)$$

Ponto do plano mediador (ponto médio do segmento de reta $[AB]$):

$$M\left(\frac{0-3}{2}, \frac{-2+0}{2}, \frac{1+1}{2}\right) = \left(-\frac{3}{2}, -1, 1\right)$$

Como o segmento de reta $[AB]$ é perpendicular ao plano mediador, temos que:

$\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, sendo $P(x, y, z)$ um ponto do plano mediador

Logo:

$$\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{3}{2}, y + 1, z - 1\right) \cdot (-3, 2, 0) = 0$$

$$\Leftrightarrow -3x - \frac{9}{2} + 2y + 2 = 0 \Leftrightarrow -3x + 2y - \frac{5}{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow -6x + 4y - 5 = 0$$

Assim, $-6x + 4y - 5 = 0$ é uma equação cartesiana do plano mediador de $[AB]$.

10.2. Sabemos que $\overrightarrow{AB}(-3, 2, 0)$.

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (2, -3, -2) - (0, -2, 1) = (2, -1, -3)$$

Vamos verificar que não existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{AC}$.

$$(-3, 2, 0) = \lambda(2, -1, -3) \Leftrightarrow \begin{cases} 2\lambda = -3 \\ -\lambda = 2 \\ -3\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = -\frac{3}{2} \\ \lambda = -2 \\ \lambda = 0 \end{cases}$$

Logo, os pontos A, B e C não são colineares.

Determinemos as coordenadas de um vetor normal ao plano θ .

Seja $\vec{n}(a, b, c)$, a, b e $c \in \mathbb{R}$ um vetor normal ao plano θ ,

então:

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a, b, c) \cdot (-3, 2, 0) = 0 \\ (a, b, c) \cdot (2, -1, -3) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -3a + 2b = 0 \\ 2a - b - 3c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{3}{2}a \\ 2a - \frac{3}{2}a - 3c = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{3}{2}a \\ \frac{a}{2} = 3c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{3}{2}a \\ \frac{1}{6}a = c \end{cases}$$

Logo, $\vec{n}\left(a, \frac{3}{2}a, \frac{1}{6}a\right)$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Por exemplo, se $a = 6$, temos: $\vec{n}(6, 9, 1)$ é um vetor normal ao plano θ .

Assim, uma equação cartesiana do plano θ é:

$6(x-0) + 9(y+2) + 1(z-1) = 0$, pois A pertence ao plano θ

$$\Leftrightarrow 6x + 9y + 18 + z - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 6x + 9y + z + 17 = 0$$

Portanto, $6x + 9y + z + 17 = 0$ é uma equação cartesiana do plano θ .

11. As retas r e s são paralelas pois os seus vetores diretores, $\vec{r}(2, 0, -1)$ e $\vec{s}(2, 0, -1)$, respetivamente, são colineares.

O facto de um vetor ser perpendicular a $\vec{r}$ e a $\vec{s}$ não garante que seja perpendicular ao plano α que contém as duas retas.

Vamos, então, determinar as coordenadas de dois vetores do plano α com direções diferentes. Um deles pode ser

2.2. Equações de planos no espaço

$\vec{r}(2, 0, -1)$ e o outro pode ser $\overline{AB}$ sendo A e B pontos de cada uma das retas.

Seja, por exemplo, $A(1, -3, 1)$ e $B(0, 1, -4)$, então,

$$\overline{AB} = (0, 1, -4) - (1, -3, 1) = (-1, 4, -5).$$

Seja $\vec{n}(a, b, c)$, a, b e $c \in \mathbb{R}$ um vetor normal ao plano α , temos:

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{r} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overline{AB} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a, b, c) \cdot (2, 0, -1) = 0 \\ (a, b, c) \cdot (-1, 4, -5) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a - c = 0 \\ -a + 4b - 5c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 2a \\ -a + 4b - 5(2a) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 2a \\ -a + 4b - 10a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 2a \\ 4b = 11a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 2a \\ b = \frac{11}{4}a \end{cases}$$

Logo, $\vec{n}\left(a, \frac{11}{4}a, 2a\right)$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Por exemplo, se $a = 4$, então $\vec{n}(4, 11, 8)$ é um vetor normal ao plano α .

Com o ponto $A(1, -3, 1)$ pertence ao plano α , então

$$4(x-1) + 11(y+3) + 8(z-1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4x - 4 + 11y + 33 + 8z - 8 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4x + 11y + 8z + 21 = 0$$

Portanto, $4x + 11y + 8z + 21 = 0$ é uma equação cartesiana do plano α .

12.1. $\vec{n}_\alpha(6, 4, 2)$ é um vetor normal do plano α .

$\vec{r}(3, 2, 1)$ é um vetor diretor da reta r .

Como $\vec{n}_\alpha = 2\vec{r}$, então $\vec{n}_\alpha$ e $\vec{r}$ são colineares e, portanto, a reta r é perpendicular ao plano α .

12.2. $\vec{n}_\alpha = (-1, 2, 1) \cdot (2, 3, -4) = -2 + 6 - 4 = 0$, então $\vec{n}_\alpha$ e $\vec{r}$ são perpendiculares e, portanto, a reta r é paralela ao plano α .

12.3. $\vec{n}_\alpha(3, -1, 0)$ é um vetor normal ao plano α .

$\vec{r}(1, 3, 2)$ é um vetor diretor de reta r .

Como $\vec{n}_\alpha \cdot \vec{r} = (3, -1, 0) \cdot (1, 3, 2) = 3 - 3 + 0 = 0$, então $\vec{n}_\alpha$ e $\vec{r}$ são perpendiculares e, portanto, a reta r é paralela ao plano α .

12.4. $\vec{n}_\alpha(-4, -1, 3)$ é um vetor normal ao plano α .

$\vec{r}(4, 1, -3)$ é um vetor diretor da reta r .

Como $\vec{n}_\alpha = -1\vec{r}$, então $\vec{n}_\alpha$ e $\vec{r}$ são colineares e, portanto, a reta r é perpendicular ao plano α .

12.5. $\vec{n}_\alpha(2, 0, 3)$ é um vetor normal ao plano α .

$\vec{r}(-3, 1, -2)$ é um vetor diretor da reta r .

Como, não existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\vec{n}_\alpha = \lambda\vec{r}$, a reta r não é perpendicular ao plano α .

E como:

$$\vec{n}_\alpha \cdot \vec{r} = (2, 0, 3) \cdot (-3, 1, -2) = -6 + 0 - 6 = -12 \neq 0, \text{ então}$$

a reta r não é paralela ao plano α .

Portanto, a reta r é concorrente não perpendicular ao plano α .

13. Sejam $\vec{n}_\alpha(k, 3, 2k)$ e $\vec{n}_\beta(3k, 1, -3)$, com $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, vetores normais aos planos α e β , respectivamente. Temos que $\alpha \perp \beta \Leftrightarrow \vec{n}_\alpha \perp \vec{n}_\beta \Leftrightarrow \vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta = 0$.

Logo:

$$(k, 3, 2k) \cdot (3k, 1, -3) = 0 \Leftrightarrow 3k^2 + 3 - 6k = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k^2 - 2k + 1 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (k-1)^2 = 0 \Leftrightarrow k-1 = 0 \Leftrightarrow k = 1$$

Portanto, $k = 1$.

14. $s: (x, y, z) = (1, 2, 2) + k(2, -3, 0)$, $k \in \mathbb{R}$

Da equação vetorial da reta s , resulta:

$$\begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 - 3\lambda, \lambda \in \mathbb{R} \\ z = 2 \end{cases}$$

Portanto, $P(1 + 2\lambda, 2 - 3\lambda, 2)$ é um ponto genérico da reta s .

Substituindo as coordenadas de P na equação do plano θ , temos:

$$(1 + 2\lambda) + 2(2 - 3\lambda) - 2 = 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -1 - 2\lambda + 4 - 6\lambda - 2 = 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -8\lambda = 3 \Leftrightarrow \lambda = -\frac{3}{8}$$

Logo, P tem coordenadas $\left(1 + 2\left(-\frac{3}{8}\right), 2 - 3\left(-\frac{3}{8}\right), 2\right)$ pelo

que a reta s intersecta o plano θ no ponto de coordenadas

$$\left(\frac{1}{4}, \frac{25}{8}, 2\right).$$

15.1. Determinemos uma equação vetorial da reta r que passa pelo ponto P e é perpendicular ao plano α .

$\vec{n}(2, 1, -1)$ é vetor normal ao plano α e como r é

perpendicular a este plano, então $\vec{r}(2, 1, -1)$ é um vetor diretor da reta r .

Assim, $(x, y, z) = (-1, 2, 0) + k(2, 1, -1)$, $k \in \mathbb{R}$ é uma equação vetorial da reta r .

15.2. Determinemos, agora, as coordenadas do ponto de interseção da reta r com o plano α .

$R(-1 + 2k, 2 + k, -k)$, $k \in \mathbb{R}$ são as coordenadas de um ponto genérico da reta r .

Substituindo na equação do plano α , temos:

$$2(-1 + 2k) + (2 + k) - (-k) + 6 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2 + 4k + 2 + k + k + 6 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 6k + 6 = 0 \Leftrightarrow k = -1$$

Logo, $R(-3, 1, 1)$ é o ponto de interseção da reta r com o plano α .

15.3. $d(P, \alpha) = d(P, R)$, ou seja:

$$d(P, R) = \sqrt{(-3+1)^2 + (1-2)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6}$$

Portanto, a distância do ponto P ao plano α é igual a $\sqrt{6}$.

16.1. Temos que $\vec{n}(6, 0, 1)$ é um vetor normal ao plano PQV .

Como a reta r é perpendicular ao plano PQV , um vetor diretor da reta r pode ser $\vec{r}(6, 0, 1)$.

A reta r passa em N , determinemos as coordenadas deste ponto.

2.2. Equações de planos no espaço

$P(x, 0, 0)$ pertence ao plano PQV , logo:

$$6x + 0 - 12 = 0 \Leftrightarrow 6x = 12 \Leftrightarrow x = 2, \text{ portanto, } P(2, 0, 0) \text{ e}$$

como a base da pirâmide é um quadrado, temos que $N(0, 2, 0)$.

Assim, $(x, y, z) = (0, 2, 0) + \lambda(6, 0, 1), \lambda \in \mathbb{R}$ é uma equação vetorial da reta r .

16.2. $V(1, 1, z)$ pertence ao plano PQV , pelo que

$$6 \times 1 + z - 12 = 0 \Leftrightarrow 6 + z - 12 = 0 \Leftrightarrow z = 6$$

Logo, $V(1, 1, 6)$.

Determinemos as coordenadas de um vetor diretor da reta VN .

$$\overline{VN} = N - V = (0, 2, 0) - (1, 1, 6) = (-1, 1, -6)$$

Como a reta s é paralela à reta VN , então $\vec{s}(-1, 1, -6)$ é

um vetor diretor da reta s .

A reta s passa pelo ponto P , logo

$$(x, y, z) = (2, 0, 0) + k(-1, 1, -6), k \in \mathbb{R} \text{ é uma equação}$$

vetorial da reta s .

16.3. $\overline{VP} = P - V = (2, 0, 0) - (1, 1, 6) = (1, -1, -6)$

$$\overline{VN} = (-1, 1, -6)$$

$$\|\overline{VP}\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + (-6)^2} = \sqrt{38}$$

$$\|\overline{VN}\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + (-6)^2} = \sqrt{38}$$

$$\overline{VP} \cdot \overline{VN} = (1, -1, -6) \cdot (-1, 1, -6) =$$

$$= 1 \times (-1) + (-1) \times 1 + (-6) \times (-6) =$$

$$= -1 - 1 + 36 = 34$$

Assim,

$$\cos \alpha = \cos(\widehat{\overline{VP}, \overline{VN}}) = \frac{\overline{VP} \cdot \overline{VN}}{\|\overline{VP}\| \|\overline{VN}\|} = \frac{34}{\sqrt{38} \sqrt{38}} = \frac{34}{38} = \frac{17}{19}$$

$$\text{Portanto, } \cos \alpha = \frac{17}{19}.$$

16.4. $\overline{VN}(-1, 1, -6)$

$$\overline{OV} = V - O = (1, 1, 6)$$

Seja $\vec{n}(a, b, c), a, b$ e $c \in \mathbb{R}$, um vetor normal ao plano

OVN , então:

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overline{VN} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overline{OV} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a, b, c) \cdot (-1, 1, -6) = 0 \\ (a, b, c) \cdot (1, 1, 6) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -a + b - 6c = 0 \\ a + b + 6c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = a + 6c \\ c + a + 6c + 6c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = a + 6c \\ 2a + 12c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -6c + 6c \\ a = -6c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = -6c \end{cases}$$

Logo, $\vec{n}(-6c, 0, c), c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Por exemplo, se $c = 1, \vec{n}(-6, 0, 1)$ é um vetor normal ao plano OVN .

Portanto, como o plano OVN passa na origem:

$$OVN: -6(x-0) + 0(y-0) + 1(z-0) = 0 \Leftrightarrow -6x + z = 0$$

17. Sejam $\vec{n}_\beta(5k, 2, -1)$ e $\vec{n}_\theta(-1, 3k^2, 3+2k), k \in \mathbb{R}^+$ vetores normais aos planos β e θ , respetivamente.

$$\beta \perp \theta \Leftrightarrow \vec{n}_\beta \perp \vec{n}_\theta \Leftrightarrow \vec{n}_\beta \cdot \vec{n}_\theta = 0$$

$$(5k, 2, -1) \cdot (-1, 3k^2, 3+2k) = 0 \wedge k \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -5k + 6k^2 - 3 - 2k = 0 \wedge k \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 6k^2 - 7k - 3 = 0 \wedge k \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{7 \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \times 6 \times (-3)}}{2 \times 6} \wedge k \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(k = \frac{7+11}{12} \vee k = \frac{7-11}{12} \right) \wedge k \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(k = \frac{3}{2} \vee k = -\frac{1}{3} \right) \wedge k \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{3}{2}$$

$$\text{Portanto, } k = \frac{3}{2}$$

Ficha para praticar 10

Págs. 48 a 51

1.1. $\overline{AB}$ é um vetor diretor da reta AB .

$$\overline{AB} = B - A = (1, 0, 1) - (1, 1, 0) = (0, -1, 1)$$

O ponto A pertence à reta AB .

$$\text{Portanto, } \begin{cases} x = 1 \\ y = 1, \lambda \in \mathbb{R} \\ z = \lambda \end{cases} \text{ é um sistema de equações}$$

paramétricas da reta AB .

1.2. A reta s é paralela ao eixo Ox , pelo que tem a direção do vetor $\vec{s}(1, 0, 0)$ e passa pelo ponto $C(0, 1, 1)$, portanto

$$(x, y, z) = (0, 1, 1) + k(2, 0, 0), k \in \mathbb{R} \text{ é uma equação vetorial da reta } AB.$$

1.3. Os pontos A, B e C são colineares se e somente se, existe um $\lambda \in \mathbb{R}$, tal que $\overline{AB} = \lambda \overline{AC}$.

Tem-se que:

$$\overline{AB}(0, -1, -1)$$

$$\overline{AC} = C - A = (0, 1, 1) - (1, 1, 0) = (-1, 0, 1)$$

Assim:

$$\overline{AB} = \lambda \overline{AC} \Leftrightarrow (0, -1, -1) = \lambda(-1, 0, 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 0 = -\lambda \wedge -1 = 0 \wedge -1 = \lambda$$

o que é impossível, então os pontos A, B e C não são colineares.

1.4. Para que os pontos A, B e C determinem um plano, basta que eles não sejam colineares. Portanto, estes pontos definem um plano.

Por outro lado, tem-se que o plano ABC passa no ponto A e tem a direção dos vetores $\overline{AB}(0, -1, 1)$ e $\overline{AC}(-1, 0, 1)$.

Assim, uma equação vetorial do plano ABC é:

$$(x, y, z) = A + \lambda \overline{AB} + \mu \overline{AC}, \lambda \text{ e } \mu \in \mathbb{R}, \text{ ou seja:}$$

$$(x, y, z) = (1, 1, 0) + \lambda(0, -1, 1) + \mu(-1, 0, 1), \lambda \text{ e}$$

$$\mu \in \mathbb{R}.$$

Então, um sistema de equações paramétricas do plano ABC é:

$$\begin{cases} x = 1 - \mu \\ y = 1 - \lambda, \lambda \text{ e } \mu \in \mathbb{R} \\ z = \lambda + \mu \end{cases}$$

2.2. Equações de planos no espaço

- 1.5. Para verificar se o ponto $P(1, 1, 1)$ pertence ao plano ABC , substitui-se x por 1, y por 1 e z por 1 no sistema de equações paramétricas do plano ABC , e resolve-se o sistema:

$$\begin{cases} 1 = 1 - \mu \\ 1 = 1 - \mu \\ 1 = \lambda + \mu \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu = 0 \\ \lambda = 0 \\ 1 = 0 \end{cases}$$

O sistema é impossível, portanto, o ponto $P(1, 1, 1)$ não pertence ao plano ABC .

Por outro lado, para verificar se o ponto $Q(0, 0, 2)$ pertence ao plano ABC , substitui-se x e y por 0 e z por 2 no sistema de equações paramétricas do plano ABC , e resolve-se o sistema:

$$\begin{cases} 0 = 1 - \mu \\ 0 = 1 - \lambda \\ 2 = \lambda + \mu \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu = 1 \\ \lambda = 1 \\ 2 = 1 + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu = 1 \\ \lambda = 1 \\ 2 = 2 \end{cases}$$

O sistema é possível, sendo $\mu = 1$ e $\lambda = 1$, pelo que o ponto $Q(0, 0, 2)$ pertence ao plano ABC .

- 2.1. O plano α passa pela origem do referencial, ou seja, pelo ponto $O(0, 0, 0)$ e tem a direção dos vetores $\vec{u}(0, 1, 0)$ e $\vec{v}(1, 1, 0)$, pelo que:

$(x, y, z) = (0, 0, 0) + \lambda(0, 1, 0) + \mu(1, 1, 0)$, λ e $\mu \in \mathbb{R}$, isto é, $(x, y, z) = \lambda(0, 1, 0) + \mu(1, 1, 0)$, λ e $\mu \in \mathbb{R}$ é uma equação vetorial do plano α .

- 2.2. A reta r é definida pelo seguinte sistema de equações paramétricas:

$$\begin{cases} x = -\lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

pelo que $(x, y, z) = (0, 1, 1) + \lambda(-1, -1, 1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ é uma equação vetorial da reta r .

- 2.3. Necessitamos de determinar um vetor $\vec{n}(a, b, c)$ normal a α .

Se $\vec{n}$ é um vetor normal ao plano α , então é perpendicular aos vetores $\vec{u}(0, 1, 0)$ e $\vec{v}(1, 1, 0)$ que são paralelos a α :

$$\begin{cases} (a, b, c) \cdot (0, 1, 0) = 0 \\ (a, b, c) \cdot (1, 1, 0) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = 0 \end{cases}$$

Então, $\vec{n}(0, 0, c)$, com $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, define a família de vetores normais ao plano α .

Por exemplo, se $c = 1$ temos $\vec{n}(0, 0, 1)$ que é um vetor normal ao plano α .

Sabe-se que o ponto $(0, 0, 0)$ pertence ao plano α , logo, uma equação cartesiana do plano α é:

$$0(x - 0) + 0(y - 0) + 1(z - 0) = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

A equação pedida é $z = 0$.

- 2.4. Um vetor diretor da reta r é $\vec{r}(-1, 1, 1)$ e um vetor normal ao plano α é $\vec{n}(0, 0, 1)$.

A reta r é paralela ao plano α se e somente se $\vec{r} \perp \vec{n}$, ou seja, $\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$.

Tem-se que: $(-1, 1, 1) \cdot (0, 0, 1) = -1 \times 0 + 1 \times 0 + 1 \times 1 = 1$ diferente de 0, pelo que $\vec{r} \cdot \vec{n} \neq 0$ e sendo assim a reta r não é paralela ao plano α .

Por outro lado: $\begin{cases} x = -\lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$ é um sistema de equações

paramétricas da reta r , pelo que $(-\lambda, 1 - \lambda, 1 + \lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ são as coordenadas de um ponto genérico de r . Substituindo x por $-\lambda$, y por $1 - \lambda$ e z por $1 + \lambda$, na equação $z = 0$ do plano α , vem que:

$$1 + \lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = -1$$

Logo, $(1, 2, 0)$ são as coordenadas do ponto de interseção da reta r com o plano α .

- 3.1. O plano β passa pelo ponto $P(3, -1, 5)$ e é perpendicular à reta r .

$\vec{r}(3, 4, -2)$ é um vetor diretor da reta r , portanto,

$\vec{r}(3, 4, -2)$ é um vetor normal ao plano β .

Assim, uma equação cartesiana do plano β é:

$$3(x - 3) + 4(y + 1) - 2(z - 5) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3x - 9 + 4y + 4 - 2z + 10 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3x + 4y - 2z + 5 = 0$$

Portanto, $3x + 4y - 2z + 5 = 0$ é uma equação cartesiana do plano β .

- 3.2. O eixo Oz pode ser definida pela condição $x = 0 \wedge y = 0$.

Assim:

$$\begin{cases} x = 0 \wedge y = 0 \\ 3x + 4y - 2z + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \wedge y = 0 \\ -2z + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \wedge y = 0 \\ z = \frac{5}{2} \end{cases}$$

Portanto, $(0, 0, \frac{5}{2})$ são as coordenadas do ponto de interseção do plano β com o eixo Oz .

- 4.1. Sejam $\vec{n}(a, b, c)$ os vetores normais ao plano α , então n é perpendicular a $\vec{u}(2, -1, 0)$ e a $\vec{v}(3, 2, -1)$, ou seja,

$\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ e $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$, o que é equivalente ao sistema

$$\begin{cases} (a, b, c) \cdot (2, -1, 0) = 0 \\ (a, b, c) \cdot (3, 2, -1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - b = 0 \\ 3a + 2b - c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 2a \\ 3a + 2 \times 2a - c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 2a \\ 3a + 4a - c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 2a \\ c = 7a \end{cases}, \text{ portanto } \vec{n}(a, 2a, 7a), a \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ a família}$$

de vetores normais a α .

- 4.2. A família de vetores normais a α é:

$$\vec{n}(a, 2a, 7a), a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Por exemplo, se $a = 1$, $\vec{n}(1, 2, 7)$.

Assim, o plano α passa pelo ponto de coordenadas

$(2, -1, 4)$ e $\vec{n}(1, 2, 7)$ é um vetor normal a este plano,

Logo uma equação cartesiana de α é:

2.2. Equações de planos no espaço

$$\begin{aligned} 1(x-2) + 2(y+1) + 7(z-4) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x - 2 + 2y + 2 + 7z - 28 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x + 2y + 7z - 28 &= 0 \end{aligned}$$

Portanto, a equação pedida é $x + 2y + 7z - 28 = 0$.

- 5.1. Os pontos A , B e C definem um plano se e somente se não forem colineares, ou seja, se os vetores $\overline{AB}$ e $\overline{AC}$ não forem colineares.

$$\overline{AB} = B - A = (0, 4, -1) - (-2, 0, 1) = (2, 4, -2)$$

$$\overline{AC} = C - A = (2, 3, -1) - (-2, 0, 1) = (4, 3, -2)$$

Como não existe um número real λ tal que $\overline{AC} = \lambda \overline{AB}$, podemos concluir que os vetores $\overline{AB}$ e $\overline{AC}$ não são colineares, pelo que os pontos A , B e C definem um plano.

- 5.2. $\overline{AB}(2, 4, -2)$ e $\overline{AC}(4, 3, -2)$ são vetores paralelos ao plano ABC .

Seja $\vec{n}(a, b, c)$ um vetor normal ao plano ABC .

Então:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overline{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overline{AC} = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} (a, b, c) \cdot (2, 4, -2) = 0 \\ (a, b, c) \cdot (4, 3, -2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + 4b - 2c = 0 \\ 4a + 3b - 2c = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} a + 2b - c = 0 \\ 4a + 3b - 2c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} c = a + 2b \\ 4a + 3b - 2(a + 2b) = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} c = a + 2b \\ 4a + 3b - 2a - 4b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} c = a + 2b \\ 2a - b = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} c = a + 2(2a) \\ b = 2a \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} c = a + 4a \\ b = 2a \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} c = 5a \\ b = 2a \end{cases} \end{aligned}$$

Portanto, $\vec{n}(a, 2a, 5a)$, com $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, define a família de vetores normais ao plano ABC .

Por exemplo, para $a = 1$, obtém-se $\vec{n}(1, 2, 5)$ que é um vetor normal ao plano ABC .

Como o plano ABC passa no ponto $A(-2, 0, 1)$ e admite $\vec{n}(1, 2, 5)$ como vetor normal, tem-se que uma equação cartesiana do plano ABC é:

$$\begin{aligned} 1(x+2) + 2(y-0) + 5(z-1) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x + 2 + 2y + 5z - 5 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x + 2y + 5z - 3 &= 0 \end{aligned}$$

Assim, $x + 2y + 5z - 3 = 0$ é uma equação cartesiana do plano ABC .

6. Sejam $\vec{r}(-2, 3, -1)$ e $\vec{t}(0, 2, -1)$ vetores diretores das retas r e t , respetivamente. Estes vetores não têm a mesma direção, pelo que as retas r e t não são paralelas. Por outro lado, o ponto P de coordenadas $(0, 3, 0)$ pertence quer à reta r , quer à reta t , pelo que as retas r e t são concorrentes no ponto P . Então, o plano α que contém as retas r e t é o plano definida por P e pelos vetores $\vec{r}$ e $\vec{t}$. Vamos, determinar um vetor normal a α . Seja $\vec{n}(a, b, c)$ esse vetor.

$$\begin{aligned} \begin{cases} (a, b, c) \cdot \vec{r} = 0 \\ (a, b, c) \cdot \vec{t} = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} (a, b, c) \cdot (-2, 3, -1) = 0 \\ (a, b, c) \cdot (0, 2, -1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} -2a + 3b - c = 0 \\ 2b - c = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} -2a + 3b - 2b = 0 \\ c = 2b \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} -2a + b = 0 \\ c = 2b \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{b}{2} \\ c = 2b \end{cases} \end{aligned}$$

Portanto, $\vec{n}\left(\frac{b}{2}, b, 2b\right)$, $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ é a família de vetores normais ao plano α .

Por exemplo, para $b = 2$, obtém-se $\vec{n}(1, 2, 4)$ que é um vetor normal ao plano α .

Assim, uma equação cartesiana do plano α é:

$$\begin{aligned} 1(x-0) + 2(y-3) + 4(z-0) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x + 2y - 6 + 4z &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x + 2y + 4z - 6 &= 0 \end{aligned}$$

Então, $x + 2y + 4z - 6 = 0$ é uma equação cartesiana do plano definido pelas retas r e t .

- 7.1. Substituindo x por 0, y por 1 e z por -2 na equação vetorial da reta r , tem-se que:

$$\begin{aligned} (0, 1, -2) &= (2, 0, -3) + t(-2, 1, -1), t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 0 &= 2 - 2t \wedge 1 = t \wedge -2 = -3 - t, t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow t &= 1 \wedge t = 1 \wedge t = -1, t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow t = 1 \wedge t = -1$, o que é impossível, portanto o ponto A não pertence à reta r .

Substituindo, agora, x por 6, y por -2 e z por -1 na equação vetorial da reta r , tem-se que:

$$\begin{aligned} (6, -2, -1) &= (2, 0, -3) + k(-2, 1, -1), k \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 6 &= 2 - 2k \wedge -2 = t \wedge -1 = -3 - t, t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2k &= -6 + 2 \wedge t = -2 \wedge t = -3 + 1, t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow t &= -2 \wedge t = -2 \wedge t = -2, t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow t = -2 \end{aligned}$$

Portanto, o ponto B pertence à reta r .

Assim, o ponto A não pertence à reta r e o ponto B pertence à reta r .

- 7.2. O ponto de interseção da reta r com o plano yOx tem abcissa nula.

$$\begin{aligned} \text{Assim, e substituindo } x \text{ por } 0 \text{ na equação vetorial da reta } r: \\ (0, y, z) &= (2, 0, -3) + t(-2, 1, -1), t \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow 0 &= 2 - 2t \wedge y = t \wedge z = -3 - t, t \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow t &= 1 \wedge y = 1 \wedge t = -3 - 1, t \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow t &= 1 \wedge y = 1 \wedge t = -4 \end{aligned}$$

Logo, a reta r intersecta o plano yOx no ponto de coordenadas $(0, 1, -4)$.

- 7.3. Um vetor diretor da reta r é $\vec{r}(-2, 1, -1)$. Logo, o vetor $\vec{r}(-2, 1, -1)$ é um vetor diretor da reta t .

Sabe-se, ainda, que a reta t passa pela origem do referencial. Portanto, uma equação vetorial da reta t é:

$$(x, y, z) = k(-2, 1, -1), k \in \mathbb{R}$$

- 8.1. A reta PV , definida por:

$$(x, y, z) = (6, -2, 0) + k(-1, 1, 0), k \in \mathbb{R}$$

admite, por exemplo, como vetor diretor o vetor $\vec{r}(-1, 1, 0)$.

2.2. Equações de planos no espaço

E como esta reta é perpendicular ao plano OPQ , $\vec{r}(-1, 1, 0)$

é um vetor normal a este plano.

Por outro lado, o ponto $Q(3, 3, 0)$ pertence ao plano OPQ ,

portanto uma equação cartesiana deste plano é:

$$-1(x-3) + (y-3) + 0(z-0) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -x + 3 + y - 3 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -x + y = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x - y = 0$$

Portanto, $x - y = 0$ é uma equação cartesiana do plano OPQ .

- 8.2.** A reta t é paralela à reta PV , pelo que tem a mesma direção que esta reta.

Como $\vec{r}(-1, 1, 0)$ é um vetor diretor da reta PV , então

também é um vetor diretor da reta t .

Por outro lado, o ponto $Q(3, 3, 0)$ pertence à reta t , pelo

que um sistema de equações paramétricas desta reta é:

$$\begin{cases} x = 3 - \lambda \\ y = 3 + \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{cases}$$

- 9.1.** Determinemos as coordenadas de três pontos não colineares do plano α .

Por exemplo:

$$\text{Se } x = 1 \text{ e } y = 1, 1 - 1 - z + 4 = 0 \Leftrightarrow z = 4.$$

Logo, $A(1, 1, 4)$

$$\text{Se } x = 0 \text{ e } y = 1, 0 - 1 - z + 4 = 0 \Leftrightarrow z = 3.$$

Logo $B(0, 1, 3)$

$$\text{Se } y = 0 \text{ e } z = 0, x - 0 - 0 + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -4.$$

Logo $C(-4, 0, 0)$.

$$\overline{AB} = B - A = (0, 1, 3) - (1, 1, 4) = (-1, 0, -1)$$

$$\overline{AC} = C - A = (-4, 0, 0) - (1, 1, 4) = (-5, -1, -4)$$

O plano α passa no ponto A e tem a direção dos vetores

$\overline{AB}$ e $\overline{AC}$

Portanto:

$$(x, y, z) = (1, 1, 4) + \lambda(-1, 0, -1) + \mu(-5, -1, -4),$$

$\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ é uma equação vetorial do plano α .

- 9.2.** Determinemos as coordenadas de três pontos não colineares do plano α .

Um dos pontos é $A(2, -3, -1)$.

Por exemplo:

$$\text{Se } x = 0 \text{ e } y = 0:$$

$$(0 - 2) - (0 + 3) + 2(z + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2 - 3 + 2z + 2 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{3}{2}$$

Logo, $B\left(0, 0, \frac{3}{2}\right)$.

$$\text{Se } x = 0 \text{ e } z = 1:$$

$$(0 - 2) - (y + 3) + 2(1 + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2 - y - 3 + 4 = 0 \Leftrightarrow y = -1$$

Logo, $C(0, -1, 1)$.

$$\overline{AB} = B - A = \left(0, 0, \frac{3}{2}\right) - (2, -3, -1) = \left(-2, 3, \frac{5}{2}\right)$$

$$\overline{AC} = C - A = (0, -1, 1) - (2, -3, -1) = (-2, 2, 2)$$

O plano α passa no ponto A e tem a direção dos vetores

$\overline{AB}$ e $\overline{AC}$, portanto:

$$(x, y, z) = (2, -3, -1) + \lambda\left(-2, 3, \frac{5}{2}\right) + \mu(-2, 2, 2),$$

$\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ é uma equação do plano α .

- 9.3.** Determinemos as coordenadas de três pontos não colineares do plano α .

Por exemplo:

$$\text{Se } x = 0, 3 \times 0 - y + 1 = 0 \Leftrightarrow 0 - y + 1 = 0 \Leftrightarrow y = 1$$

Logo, $A(0, 1, 2)$.

$$\text{Se } y = 4, 3x - 4 + 1 = 0 \Leftrightarrow 3x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Logo, $B(1, 4, 0)$

$$\text{Se } y = -2, 3x + 2 + 1 = 0 \Leftrightarrow 3x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -1.$$

Logo, $C(-1, -2, 1)$.

$$\overline{AB} = B - A = (1, 4, 0) - (0, 1, 2) = (1, 3, -2)$$

$$\overline{AC} = C - A = (-1, -2, 1) - (0, 1, 2) = (-1, -3, -1)$$

O plano α passa no ponto A e tem a direção dos vetores

$\overline{AB}$ e $\overline{AC}$. Portanto:

$$(x, y, z) = (0, 1, 2) + \lambda(1, 3, -2) + \mu(-1, -3, -1),$$

$\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ é uma equação vetorial do plano α .

- 9.4.** Determinemos as coordenadas de três pontos não colineares do plano α . Um dos pontos é $A(0, -1, 0)$.

$$\text{Se } x = 1 \text{ e } z = 2$$

$$2 \times 1 - 3(y + 1) - \frac{2}{2} = 0 \Leftrightarrow 2 - 3y - 3 - 1 = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{2}{3}$$

Logo $B\left(1, -\frac{2}{3}, 2\right)$.

$$\text{Se } y = 0 \text{ e } z = -2:$$

$$2x - 3(0 + 1) + \frac{2}{2} = 0 \Leftrightarrow 2x - 3 + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

Logo, $C(1, 0, -2)$.

$$\overline{AB} = B - A = \left(1, -\frac{2}{3}, 2\right) - (0, -1, 0) = \left(1, \frac{1}{3}, 2\right)$$

$$\overline{AC} = C - A = (1, 0, -2) - (0, -1, 0) = (1, 1, -2)$$

O plano α passa no ponto A e tem a direção dos vetores

$\overline{AB}$ e $\overline{AC}$, portanto:

$$(x, y, z) = (0, -1, 0) + \lambda\left(1, \frac{1}{3}, 2\right) + \mu(1, 1, -2),$$

$\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ é uma equação vetorial do plano α .

- 10.1.** Vamos determinar um vetor $\vec{n}(a, b, c)$ normal ao plano α .

Se $\vec{n}$ é normal ao plano α é perpendicular aos vetores

$\vec{u}(1, 2, -1)$ e $\vec{v}(0, -3, 1)$ paralelos ao plano α . Assim:

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{v} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a, b, c) \cdot (1, 2, -1) = 0 \\ (a, b, c) \cdot (0, -3, 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a + 2b - c = 0 \\ -3b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + 2b - 3b = 0 \\ c = 3b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ c = 3b \end{cases}$$

Logo, $\vec{n}(b, b, 3b)$, $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Por exemplo, se $b = 1$, tem-se $\vec{n}(1, 1, 3)$.

2.2. Equações de planos no espaço

Sabemos, então, que o plano α passa no ponto $A(1, -1, 2)$ e admite $\vec{n}(1, 1, 3)$ como vetor normal.

Uma equação cartesiana do plano α é:

$$1(x-1)+1(y+1)+3(z-2)=0 \Leftrightarrow x-1+y+1+3z-6=0 \\ \Leftrightarrow x+y+3z-6=0$$

Portanto, $x+y+3z-6=0$ é uma equação cartesiana do plano α .

10.2. Vamos determinar um vetor $\vec{n}(a, b, c)$ normal ao plano α .

Se $\vec{n}$ é normal ao plano α é perpendicular aos vetores $\vec{u}(-1, 2, 1)$ e $\vec{v}(2, -1, 1)$ paralelos ao plano α .

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{v} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a, b, c) \cdot (-1, 2, 1) = 0 \\ (a, b, c) \cdot (2, -1, 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -a+2b+c=0 \\ 2a-b+c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -a+2b+b-2a=0 \\ c=b-2a \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -3a+3b=0 \\ c=b-2a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=b \\ c=b-2b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=b \\ c=-b \end{cases}$$

Logo, $\vec{n}(b, b, -b)$, $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Por exemplo, se $b=1$, tem-se $\vec{n}(1, 1, -1)$.

Sabemos que o plano α passa no ponto $A(-1, 0, 3)$ e admite $\vec{n}(1, 1, -1)$ como vetor normal.

Uma equação cartesiana do plano α é:

$$1(x+1)+1(y-0)-1(z-3)=0 \\ \Leftrightarrow x+1+y-z+3=0 \\ \Leftrightarrow x+y-z+4=0$$

Portanto, $x+y-z+4=0$ é uma equação cartesiana do plano α .

11. $r: (x, y, z) = (0, -4, 7) + k(1, 2, -4)$, $k \in \mathbb{R}$

$$s: \begin{cases} x = -3 + 2k \\ y = -k \\ z = -11 + 7k \end{cases}, k \in \mathbb{R}$$

11.1. $\vec{r}(1, 2, -4)$ é um vetor diretor de r

$\vec{s}(2, -1, 7)$ é um vetor diretor de s

$\frac{2}{1} \neq \frac{-1}{2}$. Logo, as retas r e s não são paralelas.

$$(1, -2, 3) = (0, -4, 7) + k(1, 2, -4), k \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 = k \\ -2 = -4 + 2k \\ 3 = 7 - 4k \end{cases} \Leftrightarrow k = 1, \text{ logo } I \in \mathbb{R}.$$

$$\begin{cases} 1 = -3 + 2k \\ -2 = -k \\ 3 = -11 + 7k \end{cases} \Leftrightarrow k = 2, \text{ logo } I \in \mathbb{R}.$$

Logo, as retas r e s intersectam-se em I .

11.2. As retas r e s são concorrentes no ponto $I(1, -2, 3)$.

Então, o plano β que contém as outras r e s é o plano definido pelo ponto I e pelos vetores $\vec{r}(1, 2, -4)$ e $\vec{s}(2, -1, 7)$.

Vamos determinar um vetor um vetor $\vec{n}(a, b, c)$ perpendicular a $\vec{r}$ e a $\vec{s}$.

$$\begin{cases} \vec{r} \cdot \vec{n} = 0 \\ \vec{s} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (1, 2, -4) \cdot (a, b, c) = 0 \\ (2, -1, 7) \cdot (a, b, c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a+2b-4c=0 \\ 2a-b+7c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=4c-2b \\ 2(4c-2b)-b+7c=0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a=4c-2b \\ 8c-4b-b+7c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=4c-2b \\ -5b+15c=0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a=4c-2 \times 3c \\ b=3c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-2c \\ b=3c \end{cases}$$

Logo, $\vec{n}(-2c, 3c, c)$, $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Por exemplo, se $c=1$, vem que $\vec{n}(-2, 3, 1)$.

O plano β passa pelo ponto $I(1, -2, 3)$ e admite $\vec{n}(-2, 3, 1)$ como vetor normal, logo:

$$-2(x-1)+3(y+2)+1(z-3)=0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2x+2+3y+6+z-3=0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2x+3y+z+5=0$$

Portanto, $-2x+3y+z+5=0$ é uma equação artesiana do plano β .

$$\mathbf{12.1.} \quad x=0 \wedge \begin{cases} x=3+2\lambda \\ y=-1+3\lambda \\ z=\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x=0 \wedge \begin{cases} 0=3+2\lambda \\ y=-1+3\lambda \\ z=\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x=0 \wedge \begin{cases} \lambda = -\frac{3}{2} \\ y = -1 + 3\left(-\frac{3}{2}\right) \\ z = -\frac{3}{2} \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x=0 \wedge \begin{cases} \lambda = -\frac{3}{2} \\ y = -\frac{11}{2} \\ z = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

Logo, o ponto da reta s com abscissa igual a 0 tem

$$\text{coordenadas } \left(0, -\frac{11}{2}, -\frac{3}{2}\right).$$

12.2. $\vec{r}(2, 3, 1)$ é um vetor diretor da reta r .

$\vec{n}(-4, -2, 0)$ é um vetor normal ao plano θ .

Como $\vec{r} \cdot \vec{n} = (2, 3, 1) \cdot (-4, -2, 0) = -8 - 6 + 0 = -14 \neq 0$, então $\vec{r}$ não é perpendicular a $\vec{n}$ e, portanto, a reta r não é paralela ao plano θ .

Por outro lado, não existe $\lambda \in \mathbb{R}$, tal que $\vec{r} = \lambda \vec{n}$, logo $\vec{r}$ e $\vec{n}$ não são colineares, e, portanto, a reta s não é perpendicular ao plano θ .

13. $\vec{n}_k(1, -k, 1)$, $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ é a família de vetores normais ao plano α .

$\vec{r}_k(-2, k, 1)$, $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ é a família de vetores diretores da reta r .

A reta r e o plano α são paralelos quando e apenas quando $\vec{r}_k \perp \vec{n}_k$, ou seja, $\vec{r}_k \cdot \vec{n}_k = 0$. Assim, temos:

$$(-2, k, 1) \cdot (1, -k, 1) = 0 \Leftrightarrow -2 - k^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -1 - k^2 = 0 \Leftrightarrow k^2 = -1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k \in \emptyset, \text{ pois } \forall k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, k^2 > 0$$

2.2. Equações de planos no espaço

Na realidade, não existe k de modo que a reta r seja paralela ao plano α .

14.1. Um vetor diretor da reta AB :

$$\overline{AB} = B - A = (4, -3, 1) - (2, -1, 3) = (2, -2, -2)$$

Tomando o vetor diretor $\overline{AB}$ e, por exemplo, o ponto $A(2, -1, 3)$ obtemos as equações paramétricas:

$$\begin{cases} x = 2 + 2\lambda \\ y = -1 - 2\lambda, \lambda \in \mathbb{R} \\ z = 3 - 2\lambda \end{cases}$$

14.2. Sendo a reta s paralela ao eixo Ox , um vetor diretor da reta s é, por exemplo, $\vec{s}(1, 0, 0)$. Uma vez que passa em

$B(4, -3, 1)$, uma equação vetorial da reta s é:

$$(x, y, z) = (4, -3, 1) + \lambda(1, 0, 0), \lambda \in \mathbb{R}$$

14.3. Vetor normal ao plano mediador de $[AB]$:

$$\overline{AB} = B - A = (4, -3, 1) - (2, -1, 3) = (2, -2, -2)$$

Ponto do plano mediador de $[AB]$ é o ponto médio do segmento de reta $[AB]$.

$$M = \left(\frac{2+4}{2}, \frac{-1-3}{2}, \frac{3+1}{2} \right) = (3, -2, 2)$$

Como o segmento de reta $[AB]$ é perpendicular ao plano mediador: $\overline{MP} \cdot \overline{AB} = 0$

Sendo P um ponto do plano mediador de coordenadas (x, y, z) , uma equação do plano mediador de $[AB]$ é dada

por:

$$(x-3, y+2, z-2) \cdot (2, -2, -2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2(x-3) - 2(y+2) - 2(z-2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x - 6 - 2y - 4 - 2z + 4 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x - 2y - 2z - 6 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x - y - z - 3 = 0$$

Portanto, $x - y - z - 3 = 0$ é uma equação cartesiana do plano mediador de $[AB]$.

14.4. Seja $P(x, y, z)$ um ponto qualquer da superfície esférica de diâmetro $[AB]$:

$$\overline{AP} \cdot \overline{BP} = 0 \Leftrightarrow (x-2, y+1, z-3) \cdot (x-4, y+3, z-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-2)(x-4) + (y+1)(y+3) + (z-3)(z-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x - 2x + 8 + y^2 + 3y + y + 3 + z^2 - z - 3z + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6x + y^2 + 4y + z^2 - 4z + 14 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 + 4y + 4 + z^2 - 4z + 4 = -14 + 9 + 4 + 4$$

$$\Leftrightarrow (x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 3$$

Logo, $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 3$ é a equação pedida.

15.1. Substituindo as coordenadas do ponto A na equação da superfície esférica, temos:

$$(2-1)^2 + 1^2 + (-4+2)^2 = 6 \Leftrightarrow 1^2 + 1^2 + (-2)^2 = 6 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1+1+4=6$$

$\Leftrightarrow 6=6$, verdade, pelo que, o ponto A pertence à superfície esférica.

15.2. Seja $P(x, y, z)$ um ponto genérico do plano α , tangente à superfície esférica no ponto e seja $C(1, 0, -2)$ o centro dessa superfície esférica.

Então, $\overline{CA}$ é um vetor normal ao plano α .

$$\overline{CA} = A - C = (2, 1, -4) - (1, 0, -2) = (1, 1, -2)$$

Assim, o plano α passa pelo ponto $A(2, 1, -4)$ e admite vetor normal $\overline{CA}(1, 1, -2)$, pelo que:

$$1(x-2) + 1(y-1) - 2(z+4) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x - 2 + y - 1 - 2z - 8 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x + y - 2z - 11 = 0$$

Portanto, $x + y - 2z - 11 = 0$ é uma equação cartesiana do plano α , tangente à superfície esférica no ponto A .

16. O vetor V tem abcissa 3, pelo que $V(3, y, z)$.

Por outro lado, este ponto pertence à reta r , pelo que substituindo na equação desta reta x por 3, vem:

$$(3, y, z) = (1, 0, -1) + \lambda(2, 1, 3), \lambda \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3 = 1 + 2\lambda \wedge y = \lambda \wedge z = -1 + 3\lambda, \lambda \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda = 1 \wedge y = 1 \wedge z = -1 + 3 \times 1, \lambda \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda = 1 \wedge z = 2, \lambda \in \mathbb{R}$$

Logo, $V(3, 1, 2)$.

Reta s passa em $V(3, 1, 2)$ e é perpendicular a α .

$$s: (x, y, z) + k(2, 1, -2), k \in \mathbb{R}$$

Todo o ponto de s é da forma $(3 + 2k, 1 + k, 2 - 2k)$

Para determinar as coordenadas de I , ponto de interseção de s com α , substituímos as coordenadas de I na equação de α : $2x + y - 2z = 11$:

$$2(3 + 2k) + (1 + k) - 2(2 - 2k) = 11 \Leftrightarrow 9k = -2 \Leftrightarrow k = -\frac{2}{9}$$

Substituindo k , obtemos as coordenadas de I :

$$I \left(3 - \frac{4}{9}, 1 - \frac{2}{9}, 2 + \frac{4}{9} \right) = I \left(\frac{23}{9}, \frac{7}{9}, \frac{22}{9} \right)$$

A altura h do cone é igual a $\overline{VI}$:

$$h = \overline{VI} = \sqrt{\left(\frac{23}{9} - 3 \right)^2 + \left(\frac{7}{9} - 1 \right)^2 + \left(\frac{22}{9} - 2 \right)^2} = \sqrt{\frac{16}{81} + \frac{4}{81} + \frac{16}{81}} = \sqrt{\frac{36}{81}} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

Ficha de teste 5

Págs. 52 e 53

1. A reta r é definida pela equação $(x, y, z) = (0, -3, 1) + \lambda(1, -1, m)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ e $m \in \mathbb{R}$, portanto, $\vec{r}(1, -1, m)$ é um vetor diretor da reta r .

Por outro lado, o plano α é definido pela equação $x - 2y + 6z - 5 = 0$, pelo que $\vec{n}(1, -2, 6)$ é um vetor normal ao plano α .

A reta r é paralela ao plano α quando e apenas quando $\vec{r} \perp \vec{n}$, ou seja, $\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$.

Assim, vem que

$$(1, -1, m) \cdot (1, -2, 6) = 0 \Leftrightarrow 1 + 2 + 6m = 0 \Leftrightarrow 6m = -3$$

$$\Leftrightarrow m = -\frac{1}{2}$$

Resposta: **(B)**

2. Uma reta é paralela ao eixo Oy quando tem a direção de um vetor da família de vetores, $\vec{r}(0, y, 0)$, $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

2.2. Equações de planos no espaço

A equação $y = \frac{z}{5}$ não define uma reta (defina um plano)

A reta de equação $(x, y, z) = (5, 0, -3) + k(1, 0, 1)$, $k \in \mathbb{R}$ tem a direção do vetor $\vec{v}(1, 0, 1)$

A reta de equações paramétricas $\begin{cases} x = 2 \\ y = -\lambda, \lambda \in \mathbb{R} \\ z = \lambda \end{cases}$ tem a

direção do vetor $\vec{w}(0, -1, 1)$.

A reta definida por $x = -3 \wedge z = -2$ é paralela ao eixo Oy , ou seja, tem a direção do vetor de coordenadas $(0, 1, 0)$ que

tem a direção de Oy .

Resposta: (C)

3. $x = -1 \wedge (x+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 9$

$$\Leftrightarrow x = -1 \wedge (-1+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow x = -1 \wedge y^2 + (z-2)^2 = 9$$

define uma circunferência de raio $\sqrt{9} = 3$

$$y = 2 \wedge (x+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow y = 2 \wedge (x+1)^2 + 2^2 + (z-2)^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow y = 2 \wedge (x+1)^2 + (z-2)^2 = 5$$

define uma circunferência de raio $\sqrt{5}$.

$$x = -2 \wedge (x+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow x = -2 \wedge (-2+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow x = -2 \wedge 1 + y^2 + (z-2)^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow x = -2 \wedge y^2 + (z-2)^2 = 8$$

define uma circunferência de raio $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

$$y = \sqrt{2} \wedge (x+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow y = \sqrt{2} \wedge (x+1)^2 + (\sqrt{2})^2 + (z-2)^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow y = \sqrt{2} \wedge (x+1)^2 + 2 + (z-2)^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow y = \sqrt{2} \wedge (x+1)^2 + (z-2)^2 = 7$$

define uma circunferência de raio $\sqrt{7}$.

Resposta: (C)

4. $\alpha: x + by = 0, b \in \mathbb{R}$, pelo que $\vec{n}_\alpha(1, b, 0)$, $b \in \mathbb{R}$ é um vetor normal a α e $\beta: y + z = 0$, pelo que $\vec{n}_\beta(0, 1, 1)$ é um vetor normal a β .

Por outro lado, os planos α e β são perpendiculares se e somente se $\vec{n}_\alpha \perp \vec{n}_\beta$, isto é, $\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta = 0$.

Assim:

$$(1, b, 0) \cdot (0, 1, 1) = 0 \Leftrightarrow 1 \cdot 0 + b \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow b = 0$$

Portanto, $\alpha \perp \beta$ se e somente se $b = 0$.

Resposta: (A)

5. A direção do eixo Oy é a direção de um qualquer vetor da família de vetores $\vec{u}(0, y, 0)$, $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Um vetor normal ao plano θ é $\vec{n}(0, 2, -3)$. O plano θ é paralelo ao eixo

Oy se e somente se:

$$\vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow (0, 2, -3) \cdot (0, y, 0) = 0 \Leftrightarrow 2y = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

Como $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, então o plano θ não é paralelo ao eixo Oy .

De modo análogo, a direção do eixo Oz é a direção de um qualquer vetor da família de vetores $\vec{v}(0, 0, z)$, $z \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Um vetor normal no plano θ é $\vec{n}(0, 2, -3)$.

O plano θ é paralelo ao eixo Oz se e somente se:

$$\vec{n} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow (0, 2, -3) \cdot (0, 0, z) = 0 \Leftrightarrow -3z = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

Como $z \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, então o plano θ não é paralelo ao eixo Oz .

O eixo Ox tem a direção de um qualquer vetor da família de vetores $\vec{w}(x, 0, 0)$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Sabe-se que $\vec{n}(0, 2, -3)$ é um vetor normal a θ .

O plano θ é perpendicular ao eixo Ox se e somente se os vetores $\vec{w}$ e $\vec{n}$ forem colineares, o que não é o caso.

Finalmente, tem-se que o plano yOz pode ser definido pela equação cartesiana $x = 0$. $\vec{n}(1, 0, 0)$ é um vetor normal a este plano.

Assim, o plano θ é perpendicular ao plano yOz se e somente se $n \perp n'$, ou seja:

$$n \cdot n' = 0 \Leftrightarrow (0, 2, -3) \cdot (1, 0, 0) = 0 \Leftrightarrow 0 = 0 \text{ (verdade)}$$

Então, o plano θ é perpendicular ao plano yOz .

Resposta: (D)

6. Os vetores $\vec{u}(3, -2, 1)$ e $\vec{v}(-2, 1, 2)$ são vetores diretores do plano α , pelo que $\vec{n}(a, b, c)$ é um vetor normal ao plano α se e somente se $\vec{n} \perp \vec{u}$ e $\vec{n} \perp \vec{v}$, ou seja, $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ e $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$.

Assim:

$$\begin{cases} (a, b, c) \cdot (3, -2, 1) = 0 \\ (a, b, c) \cdot (-2, 1, 2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a - 2b + c = 0 \\ -2a + b + 2c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 2b - 3a \\ -2a + b + 2(2b - 3a) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 2b - 3a \\ -2a + b + 4b - 6a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 2b - 3a \\ 5b - 8a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 2\left(\frac{8}{5}a\right) - 3a \\ b = \frac{8}{5}a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = \frac{16}{5}a - 3a \\ b = \frac{8}{5}a \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = \frac{1}{5}a \\ b = \frac{8}{5}a \end{cases}$$

Portanto, $\vec{n}\left(a, \frac{8}{5}a, \frac{1}{5}a\right)$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ é família de vetores normais ao plano α .

Por outro lado, pretende-se determinar um vetor desta família que tenha norma igual a $3\sqrt{5}$. Assim, vem que:

$$\|\vec{n}\| = 3\sqrt{5} \Leftrightarrow \sqrt{a^2 + \left(\frac{8}{5}a\right)^2 + \left(\frac{1}{5}a\right)^2} = 3\sqrt{5} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{a^2 + \frac{64}{25}a^2 + \frac{1}{25}a^2} = 3\sqrt{5} \Leftrightarrow$$

2.2. Equações de planos no espaço

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \sqrt{\frac{90}{25}} a^2 = 3\sqrt{5} &\Leftrightarrow \sqrt{\frac{90}{25}} |a| = 3\sqrt{5} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{\sqrt{90}}{\sqrt{25}} |a| = 3\sqrt{5} &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{90}}{5} |a| = 3\sqrt{5} \\ \Leftrightarrow |a| = 3\sqrt{5} \times \frac{5}{3\sqrt{10}} &\Leftrightarrow |a| = \frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{2}} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow |a| = \frac{5}{\sqrt{2}} &\Leftrightarrow |a| = \frac{5\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow a = \frac{5\sqrt{2}}{2} \vee a = -\frac{5\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Então, se $a = \frac{5\sqrt{2}}{2}$, tem-se que

$$\vec{n} \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{8}{5} \times \frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{5} \times \frac{5\sqrt{2}}{2} \right), \text{ ou seja, } \vec{n} \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, 4\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

Portanto, $\vec{n} \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, 4\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ é, por exemplo, um vetor

normal ao plano α cuja norma é igual a $3\sqrt{5}$.

- 7.1.** Os vetores $\vec{AC}$ e $\vec{AD}$ não são colineares, pelo que os pontos A , C e D definem um plano, e estes vetores são paralelos ao plano ACD .

Seja $\vec{n}(a, b, c)$ um vetor normal ao plano ACD , então:

$$\vec{AC} = (4, 3, -1) - (4, 0, 2) = (0, 3, -3)$$

$$\vec{AD} = (1, 3, 2) - (4, 0, 2) = (-3, 3, 0)$$

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{AC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{AD} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a, b, c) \cdot (0, 3, -3) = 0 \\ (a, b, c) \cdot (-3, 3, 0) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3b - 3c = 0 \\ -3a + 3b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3b = 3c \\ 3b = 3a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = b \\ a = b \end{cases}$$

Portanto, $\vec{n}(b, b, b)$, $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ é a família de vetores normais ao plano ACD .

Por exemplo, se $b = 1$, $\vec{n}(1, 1, 1)$ é um vetor normal ao plano ACD .

O plano ACD é, então, o plano que passa em $A(4, 0, 2)$ e que admite $\vec{n}(1, 1, 1)$ como vetor normal. Assim:

$$1(x-4) + 1(y-0) + 1(z-2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x - 4 + y + z - 2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x + y + z - 6 = 0$$

Então, $x + y + z - 6 = 0$ é uma equação cartesiana do plano ACD .

- 7.2.** Sejam $P(x, y, z)$ um ponto qualquer do plano mediador de

$[CD]$ e M o ponto médio deste segmento, então,

$\vec{PM} \cdot \vec{CD} = 0$ é uma equação do plano mediador de $[CD]$.

Assim:

$$\vec{PM} = M - P$$

$$M \left(\frac{4+1}{2}, \frac{3+3}{2}, \frac{-1+2}{2} \right) \Leftrightarrow M \left(\frac{5}{2}, 3, \frac{1}{2} \right)$$

$$\vec{PM} = \left(\frac{5}{2}, 3, \frac{1}{2} \right) - (x, y, z) = \left(\frac{5}{2} - x, 3 - y, \frac{1}{2} - z \right)$$

$$\vec{CD} = (1, 3, 2) - (4, 3, -1) = (-3, 0, 3)$$

$$\vec{PM} \cdot \vec{CD} = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{5}{2} - x, 3 - y, \frac{1}{2} - z \right) \cdot (-3, 0, 3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -3 \left(\frac{5}{2} - x \right) + 0(3 - y) + 3 \left(\frac{1}{2} - z \right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -\frac{15}{2} + 3x + \frac{3}{2} - 3z = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3x - 3z - 6 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x - z - 2 = 0$$

Portanto, $x - z - 2 = 0$ é uma equação do plano mediador de $[CD]$.

- 7.3.** Seja M o ponto médio de $[AD]$: $M \left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, 2 \right)$

$$\begin{aligned} \vec{CM} = M - C &= \left(\frac{5}{2} - 4, \frac{3}{2} - 3, 2 + 1 \right) = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, 3 \right) = \\ &= -\frac{3}{2}(1, 1, -2) \end{aligned}$$

Logo, $\vec{s}(1, 1, -2)$ é um vetor diretor da reta s .

Como $C(4, 3, -1)$:

$$\begin{cases} x = 4 + \lambda \\ y = 3 + \lambda \\ z = -1 - 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R} \text{ são equações paramétricas da reta } s.$$

- 8.1.** Substituindo x por -2 , y por 0 e z por 2 na equação vetorial da reta r , vem que:

$$(-2, 0, 2) = (0, 4, -2) + t(1, -2, 2), t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2 = 0 + t \wedge 0 = 4 - 2t \wedge 2 = -2 + 2t, t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow t = -2 \wedge t = 2 \wedge t = 2, t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow t = -2 \wedge t = 2 \text{ é impossível.}$$

Portanto não existe um $t \in \mathbb{R}$ tal que:

$$(-2, 0, 2) = (0, 4, -2) + t(1, -2, 2)$$

Logo, o ponto A não pertence à reta r .

- 8.2.** O plano xOy pode ser definido pela equação $z = 0$.

Então:

$$(x, y, 0) = (0, 4, -2) + t(1, -2, 2), t \in \mathbb{R} \wedge z = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = 0 + t \wedge y = 4 - 2t \wedge 0 = -2 + 2t, t \in \mathbb{R} \wedge z = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = t \wedge y = 4 - 2t \wedge t = 1 \wedge z = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \wedge y = 2 \wedge z = 0 \wedge t = 1$$

Portanto, o ponto de interseção da reta r com o plano xOy tem coordenadas $(1, 2, 0)$.

- 8.3.** $\vec{r}(1, -2, 2)$ é um vetor diretor da reta r . Logo, $\vec{r}$ também é um vetor diretor da reta s .

Assim, $s: (x, y, z) = \lambda(1, -2, 2), \lambda \in \mathbb{R}$.

- 9.** Verifiquemos que o ponto $T(2, 1, 3)$ pertence à superfície esférica.

Substituindo as coordenadas do ponto T na equação da superfície esférica:

$$(2-1)^2 + (1-3)^2 + (-3)^2 = 14 \Leftrightarrow 1 + 4 + 9 = 14 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 14 = 14 \text{ (verdade)}$$

Portanto, o ponto T pertence à superfície esférica.

Determinemos uma equação cartesiana do plano tangente à superfície esférica no ponto T .

2.2. Equações de planos no espaço

Sejam $C(1, 3, 0)$ o centro da superfície esférica e $P(x, y, z)$ um ponto qualquer do plano cuja equação se pretende determinar, então $\overline{CT} \cdot \overline{TP} = 0$ é uma equação deste plano.

Assim:

$$\overline{CT} = T - C = (2, 1, -3) - (1, 3, 0) = (1, -2, -3)$$

$$\overline{TP} = P - T = (x, y, z) - (2, 1, -3) = (x-2, y-1, z+3)$$

Logo:

$$\overline{CT} \cdot \overline{TP} = 0 \Leftrightarrow (1, -2, -3) \cdot (x-2, y-1, z+3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x-2-2(y-1)-3(z+3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x-2-2y+2-3z-9 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x-2y-3z-9 = 0$$

$x-2y-3z-9=0$ é uma equação cartesiana do plano tangente à superfície esférica no ponto T .

10.1. Os pontos C , G e F são não colineares, pelo que definem um plano.

O vetor $\overline{BA}(-2, 6, 3)$ é normal ao plano CGF e este plano passa pelo ponto B .

Como $\overline{BA} = A - B$, então $B = A - \overline{BA}$, ou seja:

$$B = (-3, 4, 3) - (-2, 6, 3) = (-1, -2, 0)$$

Assim, uma equação cartesiana do plano CGF é:

$$-2(x+1) + 6(y+2) + 3(z-0) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2x-2+6y+12+3z = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2x+6y+3z+10 = 0$$

Portanto, $-2x+6y+3z+10=0$ é uma equação cartesiana do plano CGF .

$$10.2. \quad r: \begin{cases} x = k \\ y = 0 \\ z = k - 2 \end{cases}, k \in \mathbb{R}$$

Como $F \in \mathbb{R}$, F é da forma $(k, 0, k-2)$, $k \in \mathbb{R}$.

Como $B(-1, -2, 0)$, $\overline{BF}(k+1, 2, k-2)$.

Por outro lado, $\overline{BF} \cdot \overline{BA} = 0$.

$$(k+1, 2, k-2) \cdot (-2, 6, 3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2k-2+12+3k-6 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k = -4$$

Substituindo k , temos:

$$F(-4, 0, -6)$$

$$\overline{BF}(-3, 2, -6)$$

Logo:

$$\overline{BF} : (x, y, z) = (-1, -2, 0) + k(-3, 2, -6), k \in \mathbb{R}$$