AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA
Ficha nº 06 – Funções/Limites e Derivadas - 11º ano 2015 a 2020

11. Seja f uma função de domínio $\mathbb{R}$. Sabe-se que $f'(2) = 6$. Qual é o valor de $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x^2 - 2x}$?
 (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 **(2015-esp)**

25. Sejam f e g duas funções de domínio $\mathbb{R}^+$. Sabe-se que a reta de equação $y = -x$ é assíntota oblíqua do gráfico de f e do gráfico de g . Qual é o valor de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) \times g(x)}{x}$?
 (A) $+\infty$ (B) 1 (C) -1 (D) $-\infty$ **(2017-1ª)**

28. Seja $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ uma função tal que $f'(x) < 0$, para qualquer número real positivo x . Considere, num referencial o.n. xOy :
 • um ponto P , de abscissa a , pertencente ao gráfico de f
 • a reta r , tangente ao gráfico de f no ponto P
 • o ponto Q , ponto de intersecção da reta r com o eixo Ox
 Sabendo que $\overline{OP} = \overline{PQ}$, determine o valor de $f'(a) + \frac{f(a)}{a}$ **(2017-1ª)**

29. De uma função f , de domínio $\mathbb{R}$, com derivada finita em todos os pontos do seu domínio, sabe-se que $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{f(x) - f(2)} = 4$. Qual é o valor de $f'(2)$?
 (A) $-\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$ **(2017-2ª)**

30. Na Figura 1, está representado o gráfico de uma função f , de domínio $[-1,6]$, e, na Figura 2, está representada parte do gráfico de uma função g , de domínio $\mathbb{R}$. Tal como as figuras sugerem, em ambas as funções, todos os objetos inteiros têm imagens inteiras.

Quais são os zeros da função $g \circ f$?

(A) 0 e 4 (B) 1 e 5 (C) -1 e 3 (D) 2 e 6 **(2017-2ª)**

Figura 1

Figura 2

31. Seja f uma função de domínio $\mathbb{R}$. A tabela de variação de sinal da função f'' , segunda derivada de f , está representada ao lado. Seja g a função definida por $g(x) = -f(x-5)$. Em qual dos intervalos seguintes o gráfico de g tem concavidade voltada para baixo?

x	$-\infty$	-10		0		10	$+\infty$
f''	-	0	+	0	-	0	+

(A) $]-15, -5[$ (B) $]0, 10[$ (C) $]-5, 5[$ (D) $]5, 15[$ **(2017-2ª)**

36. Sejam f e g duas funções de domínio $\mathbb{R}$, tais que a função $f - g$ admite inversa.

Sabe-se que $f(3) = 4$ e que $(f - g)^{-1}(2) = 3$. Qual é o valor de $g(3)$?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 **(2017-E.Especial)**

43. Seja f uma função diferenciável no intervalo $[0, 2]$ tal que: $f(0) = 1$ e $\forall x \in [0, 2], 0 < f'(x) < 9$.

O teorema de Lagrange, aplicado à função f em $[0, 2]$, permite concluir que:

- (A) $0 < f(2) < 18$ (B) $1 < f(2) < 19$ (C) $2 < f(2) < 20$ (D) $3 < f(2) < 21$ **(2018-1ª fase – Cad 1)**

52. Seja g uma função real, de domínio $[0, 1]$. Sabe-se que a função g não tem mínimo.

Qual das afirmações seguintes é necessariamente verdadeira?

- (A) A função g não tem zeros. (B) A função g não é limitada.
 (C) A função g não tem máximo. (D) A função g não é contínua. **(2018-EE - Cad 2)**

61.

Figura 2

Uma lente de contacto é um meio transparente limitado por duas faces, sendo cada uma delas parte de uma superfície esférica. Na Figura 2, pode observar-se uma lente de contacto. Na Figura 3, está representado um corte longitudinal de duas superfícies esféricas, uma de centro C_1 e raio r_1 e outra de centro C_2 e raio r_2 , com $r_2 > r_1$, que servem de base à construção de uma lente de contacto, representada

Figura 3

a sombreado na figura. Seja $x = \overline{C_1 C_2}$. Sabe-se que o diâmetro, d , da lente é dado por

$$\frac{\sqrt{[(r_1 + r_2)^2 - x^2]} \left[x^2 - (r_1 - r_2)^2 \right]}{x}, \quad \text{com } r_2 - r_1 < x < \sqrt{r_2^2 - r_1^2}$$

Uma lente de contacto foi obtida a partir de duas superfícies esféricas com 7 mm e 8 mm de raio, respetivamente. O diâmetro dessa lente excede em 9 mm a distância, x , entre os centros das duas superfícies esféricas. Determine, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, o valor de x , sabendo-se que esse valor é único no intervalo

$\left] r_2 - r_1, \sqrt{r_2^2 - r_1^2} \right[$. Não justifique a validade do resultado obtido na calculadora. Na sua resposta:

- apresente uma equação que lhe permita resolver o problema;
- reproduza, num referencial, o(s) gráfico(s) da(s) função(ões) visualizado(s) na calculadora que lhe permite(m) resolver a equação;
- apresente o valor pedido em milímetros, arredondado às décimas. **(2019 - 1ª - Cad 1)**

64. Na Figura, está representado o gráfico da função f , definida em $\mathbb{R}$ por $f(x) = x^2$

Considere que um ponto P , de abcissa positiva, se desloca sobre o gráfico da função f .

Para cada posição do ponto P , seja:

- r a reta tangente ao gráfico de f nesse ponto;
- s a reta perpendicular a r e tangente ao gráfico de f
- Q o ponto de tangência da reta s com o gráfico de f
- I o ponto de intersecção das retas r e s

Mostre que, qualquer que seja a abcissa do ponto P , a ordenada do ponto I é sempre

igual a $-\frac{1}{4}$. Sugestão: Designe a abcissa do ponto P por a **(2019 - 2ª - Cad 2)**

66. Para um certo número real k , é contínua em $\mathbb{R}$ a função f , definida por $f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{x^2+x-2} & \text{se } x > 1 \\ k & \text{se } x \leq 1 \end{cases}$

Qual é o valor de k ?

- (A) 2 (B) 3 (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$ (2019 - EE - Cad 1)

67. Sejam f e g duas funções de domínio $\mathbb{R}$. Sabe-se que $f(x) = 2x + 1$ e que $(f \circ g)(x) = 7$, para todo o valor real de x . Qual das seguintes expressões define a função g ?

- (A) -3 (B) 3 (C) $x - 3$ (D) $x + 3$ (2019 - EE - Cad 2)

74. Seja f uma função, de domínio $]0, +\infty[$, cuja derivada, f' , de domínio $]0, +\infty[$, é dada por $f'(x) = \frac{2 + \ln x}{x}$

b) Qual é o valor de $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{1 - x^2}$?

- (A) -2 (B) -1 (C) 0 (D) 2 (2020 2ª)

75. Os satélites artificiais são utilizados para diversos fins e a altitude a que são colocados depende do fim a que se destinam. Admita que a Terra é uma esfera. A Figura apresenta um esquema em que se pode observar a superfície terrestre coberta por um satélite, quando este se encontra numa certa posição. Nesta figura,

- R é o raio, em quilómetros, da Terra e h é a altitude, em quilómetros, do satélite ($h > 0$)
- r é o raio, em quilómetros, da base da calote esférica cuja superfície é coberta pelo satélite ($0 < r < R$)
- as grandezas h e r podem relacionar-se por meio da igualdade $r = \frac{R}{h+R} \sqrt{h^2 + 2hR}$

Sabe-se que, para cada posição do satélite, a percentagem da área da superfície terrestre coberta pelo satélite é

dada por $50 \left(1 - \sqrt{1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2} \right)$

a) Qual é a percentagem da área da superfície terrestre coberta por um satélite se o raio da base da calote esférica for igual a $\frac{3}{5}$ do raio da Terra?

- (A) 20% (B) 15% (C) 10% (D) 5%

b) Considere que o raio da Terra é 6400 km.

Determine, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, a percentagem da área da superfície terrestre coberta por um satélite se a altitude deste for igual ao raio da base da respetiva calote esférica. Apresente o resultado arredondado às unidades. Não justifique a validade do resultado obtido na calculadora. Na sua resposta:

- apresente uma equação que lhe permita resolver o problema;
- reproduza, num referencial, o(s) gráfico(s) da(s) função(ões) visualizado(s) na calculadora que lhe permite(m) resolver a equação e apresente as coordenadas do(s) ponto(s) relevante(s) arredondadas às centésimas;
- apresente o valor pedido arredondado às unidades.

Se, nos cálculos intermédios, proceder a arredondamentos, conserve, no mínimo, duas casas decimais. (2020 2ª)

76. Um município construiu, num dos seus parques, uma rampa de skate entre duas paredes verticais distanciadas 21 metros uma da outra. Na figura ao lado, estão representados um corte longitudinal da rampa e dois jovens, cada um no seu skate. Nesta figura, o arco BD representa a rampa, os segmentos de reta $[AB]$ e $[CD]$ representam as paredes e o segmento de reta $[AC]$ representa o solo. Os pontos P e Q representam as posições dos dois jovens na rampa. Admita que a distância ao solo, em metros, de um ponto da rampa situado x metros à direita da parede representada na figura por $[AB]$ é dada por $f(x) = 0,0001x^4 - 0,005x^3 + 0,11x^2 - x + 3,4$, $0 \leq x \leq 21$

a) Qual é, em metros, com arredondamento às décimas, o valor absoluto da diferença entre as alturas das duas paredes da rampa de skate?

- (A) 0,8 (B) 0,7 (C) 0,5 (D) 0,4

b) Num certo instante, os dois jovens estão à mesma distância do solo, um mais próximo da parede representada por $[AB]$ e o outro mais próximo da parede representada por $[CD]$. O jovem que se encontra mais próximo da parede representada por $[AB]$ está a um metro desta parede. Seja d a distância a que se encontra da parede representada por $[CD]$ o jovem que dela está mais próximo. Determine, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, o valor de d , sabendo-se que esse valor existe e é único. Não justifique a validade do resultado obtido na calculadora.

Na sua resposta:

- apresente uma equação que lhe permita resolver o problema;
- reproduza, num referencial, o(s) gráfico(s) da(s) função(ões) visualizado(s) na calculadora que lhe permite(m) resolver a equação e apresente as coordenadas do(s) ponto(s) relevante(s) arredondadas às centésimas;
- apresente o valor de d em metros, arredondado às décimas.

Se, nos cálculos intermédios, proceder a arredondamentos, conserve, no mínimo, duas casas decimais. (2020 esp)

Sol : (1) B (2) A (3.a) 4,19 (3.b) 25 (4.a) Não tem (4.b) $\cap em \left] \frac{1}{2}, 1 \right[; \cup em] 1, +\infty[; PI(1,0) (4.c) 2,41 (5) D (6) A$

(7.a) $y = 0$ e $y = 1$ (7.b) $]-\infty, 0[\cup] \ln 2, 3]$ (7.c) $y = \frac{3}{4}x - 3 - \ln 4$ (9.a) 11 (10.a) $y = 0$ (10.b) $\nearrow em [0, 2];$

$\searrow em [2, +\infty[; \min = 0$ para $x = 0$; $\max = \frac{4}{e}$ para $x = 2$ (10.c) 2,92 (11) A (12) C (13) C (14) B (15) D (16) B

(17.a) $p = \frac{1}{e}$; $q = -e$ (17.b) $\cap em] -2, -1[; \cup em] -\infty, -2[e em] -1, +\infty[; PI$ para $x = -2$ e para $x = -1$

(18.a) $x = 1$ e $x = -1$ (19) B (20) A (21.a) Não tem (21.b) $-1,19e - 0,17$ (22.a) 26 (22.b) $\frac{600}{n}$ (24) D (25) A

(26.1) 1,5 (26.2) Não ($\max = 4$) (27.1) Cont em $x = 1$ (27.2) $1 + \pi$ (27.3) $-3,3$ (28) 0 (29) C (30) B (31) C

(32.1) $x = 0$ e $y = 0$ (32.2) $\left] \frac{1}{2}, 1 \right[$ (32.3) 1 (33) B (34.a) $\ln 2$ (34.b) -35 (35) A (36) B (37.a) 0 (37.b) 0,72 (38) C (39) D

(40) B (42.a) 50 (42.b) 80 (43) B (44) 0,075 (45) D (46) $[-2, 0[\cup] 2, +\infty[$ (47.a) A (47.b) sim (49) D (50) $]-1, 0[\cup] 7, 8[$

(51.a) 2 (51.b) $y = 0$ e $y = 3$ (51.c) C (52) D (53) C (54) PI(1,1); $\cap em] 0, 1[; \cup em] 1, +\infty[$ (55) 18,7 (56) C

(57.a) $\nearrow] -\infty, -1[\searrow] -1, 0[e em] 0, +\infty[; \max = -e$ para $x = -1$ (57.b) B (58) C (59) D (60) C (61) 1,4 (62) 50

(63.a) $x = 1$ e $y = 0$ (63.b) $\{0; \ln 2\}$ (65) 1,8 (66) C (67) B (68) C (69.a) A (69.b) $y = -3x + 1$ (70.a) $y = x$ (70.b) $-\ln(e - 1)$

(70.c) C (71) A (72) A (73) $y = 1$ (74.a) PI para $x = \frac{1}{e}$; $\cap em \left[\frac{1}{e}, +\infty[; \cup em \left] 0, \frac{1}{e} \right]$ (74.b) B (75.a) C (75.b) 23% (76.a) B

(76.b) 2,7